

la Lista Sistemática denominado “Citas anteriores”, por lo que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

Las observaciones de especies procedentes de escapes se incluyen en un apartado final, “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogen las citas de Cotorra Argentina ni de Bengalí Rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid. La Cotorra de Kramer parece estar empezando a establecerse como reproductora, por lo que es posible que para próximos anuarios también se excluya de este apartado.

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana y Lorenzo 1997) cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Dirección del Comité de Rarezas:

Eduardo de Juana. Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid. E-mail: rarezas@seo.org.


Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos de Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Especies Migratorias (antigua Oficina de Anillamiento) de la DGCN (MIMAM), y citas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no fue posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales; a pesar de ello,

ÍNDICE

Colibos.....	138
Somormujos y Zampullines.....	138
Cormorán Grande.....	138
Garzas.....	139
Cigüeñas.....	141
Morito, Espátula y Flamenco.....	142
Anátidas.....	142
Rapaces diurnas.....	147
Gallináceas.....	152
Rálidos.....	152
Grulla.....	152
Sisón y Avutarda.....	153
Limícolas.....	153
Gaviotas.....	160
Charrones y Fumareles.....	162
Gangos.....	162
Palomas y Tórtolas.....	162
Cotorra Argentina.....	163
Cucos.....	163
Rapaces nocturnas.....	164
Chotacabras.....	164
Vencejos.....	164
Martin Pescador, Abejaruco, Carraca y Abubilla.....	165
Picos.....	166
Aláudidos.....	166
Golondrinas.....	168
Bisbitas y Lavanderos.....	169
Mirlo Acuático y Chochín.....	170
Acentores.....	170
Túrdidos.....	170
Sílvidos.....	173
Papamoscas.....	177
Bigotudo y Mito.....	177
Páridos.....	177
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro Moscón y Oropéndola.....	178
Alcaudones.....	178
Córvidos.....	179
Estorninos.....	179
Gorriónes.....	179
Bengalí Rojo.....	180
Fringílicos.....	180
Escribanos.....	181
Observaciones procedentes de escapes.....	182



estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una observación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Algunos estatus provinciales se han modificado en función de la nueva información obtenida en anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En “Citas de interés” se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid* (Díaz *et al.* 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio “Todas las citas recibidas” por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Para ello, también se ha tenido en cuenta el *Atlas de Aves Invernantes de Madrid 1999-2001* (Del Moral *et al.* 2002).

CITAS DE INTERÉS 2003: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2003: recoge las citas anteriores a 2003 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1998) el cual se basa en Voous (1977).

Se subrayan las primeras citas de una especie para la Comunidad de Madrid, tanto de 2003 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código [los estatus invernales fueron revisados en el AOM 2002 en función de Del Moral *et al.* (2002)]:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- Iab: Invernante abundante.
- Ico: Invernante común.
- Ies: Invernante escaso.
- Ira: Invernante raro.
- Iac: Invernante accidental.
- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
- p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
- S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
- s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

- | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| ad. = adulto/s | inm. = inmaduro/s | m. = macho/s |
| ej. = ejemplar/es | ind. = individuo/s | pp. = pareja/s |
| h. = hembra/s | jov. = joven/es | |



LISTA SISTEMÁTICA 2003

En esta lista se incluyen el total de especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2003.

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 70 ad. y 25 jov. o pollos el 5.VII, 103 ind. el 20.VII, 2 ej. el 28.VIII, tras el comienzo de la media veda las aves abandonan la laguna (M. Juan/SEO-Monticola).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, unas 30 aves el 8.III y el 14.III (G. Martín García).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, cifra máxima con 48 ind. el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, les.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto para los embal-

ses de Santillana y Pedrezuela (El Vellón), donde sólo se considerarán cifras importantes, fechas extremas y observaciones estivales. Para una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 2 ind. entre el 4.I y el 9.I; 3 ej. entre el 26.I y el 23.II; 5 ej., uno en plumaje nupcial casi completo, el 27.II; 8 ej. el 23.III; 14 aves el 1.IV; 9 aves el 22.IV; 13 ad., entre los que hay 4 pp., el 18.V; 7 ind. el 8.VI; 10 ej., entre los que hay 2 pp., el 23.VI; 8 ad., de los cuales 1 pp. ceba a un pollo de pocos días y otro ad. ceba a otro pollo, el 7.VII; 5 ad. y ningún jov. lo que indicaría que ha fracasado la reproducción, el 31.VII; 1 ind. en plumaje invernal el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola, D. González, E. de Juana, J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. L. Fuentes Serrano/Naumanni y C. Álvarez Usategui).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje nupcial el 13.IV y 2 ej. el 27.IV (D. González).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ej. el 17.V (I. Rodríguez y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera cita postnupcial, 3 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 11 ej. el 22.XI (G. Núñez-Lagos).

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, gravera Soto las Cuevas, 7 aves, de ellas 3 mudando y 4 en plumaje de verano, el 1.IV.2002 (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 15 aves el 12.V.2002 (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).

Paíño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: lab, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivaes y citas de interés.

- Madrid, parque lineal del río Manzanares, por primera vez desde 1978 se observa un pequeño dormidero sobre las ramas secas de un gran álamo negro (*Populus nigra*) en la margen derecha del río, utilizado por 1 ad. y 1 jov. el 28.I, 2 jov. el 6.II, 1 jov. el 18.III y 1 jov. el 2.IV (J. Cano).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 59 aves descansando en la orilla el 28.I (G. Martín García).

- Alcalá de Henares, río Henares: paso prenupcial: 12 ej. el 12.III, 23 ej. el 13.III, 30 el 14.III, 7 el 24.III, 37 el 28.III; paso postnupcial: 7 ind. el 25.IX, 4 el 3.X, 4 el 4.X, 107 el 17.X, 44 el 20.X, 26 el 21.X, 5 el 22.X, 62 el 29.X (J. Prieto, J. J. Díaz, E. Estalrich, C. Cuesta y J. Herrera).

- Aranjuez, soto Pavera, 36 ej. volando hacia el norte sobre el río Tajo el 8.IV (J. Cano).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. de primer verano el 10.V (D. González).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ad. el 18.V (D. González); 23 ad. el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Las Rozas de Madrid, embalse de Molino de la Hoz, 1 jov. posado en un árbol esacasado por dos urracas el 21.V (J. Ruiz).

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, arroyo de El Batán, 1 subadulto posado en una piedra el 1.VI (J. Ruiz).

- Madrid, embalse de El Pardo, 8 ind. posados el 25.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, cifra excepcional, 291 ind. el 29.XI (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama y X. Piñeiro).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, entre 26-30 aves presentes todo el invierno utilizan el embalse para alimentarse durante el día y al atardecer se dirigen hacia un dormidero situado hacia el suroeste, posiblemente el de Las Zorreras (G. Martín García).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 ej. cantando a media mañana el 29.VI (J. L. Fuentes Serrano/Naumannii) y 1 ej. sobrevuela el cañaveral el 1.XI (J. Ruiz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave es espantada del carrizal el 14.XII (M. Fernández/Naumannii).

Citas anteriores a 2003

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. cantando al atardecer el 21.V.2002 y el 3.VII.2002 (J. L. Fuentes Serrano/Naumannii).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, les.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- Arganda del Rey, Puente de Arganda sobre el río Jarama, 1 m. ad. posado en el carrizal el 18.I (J. Ruiz).

- Arganda del Rey, gravera de El Campillo, 1 m. el 10.II (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 1 m. ad. el 26.IV (J. Ruiz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, se anilla 1 ej. el 9.XI y se recaptura el 13.XII (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ej. el 21.XI (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. el 3.XII (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, les.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Las Rozas de Madrid, embalse de Molino de la Hoz, 1 ad. el 28.III (C. Andrés Barrera).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 5 ej. el 5.IV (J. Prieto y K. Cabrera).

- El Escorial, urbanización Los Arroyos, primera observación, 1 ave en vuelo el 5.IV (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, parque Juan Carlos I, se localiza un nido con 1 ad. incubando en un olivo en una isleta del estanque el 23.IV, posteriormente se observan 3 pollos en el nido el

9.V (J. J. Castellanos). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 63 (VK47).

- Leganés, parque de Polvoranca, laguna del arroyo Recomba, 1 ad. el 15.V (F. J. Ortega Pinilla).

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas, 1 ad. pescando el 25.V (F. J. Ortega Pinilla).

- El Escorial, cola del embalse de Valmayor, 3 ad. posados en unos troncos sobre el agua el 31.V (J. Ruiz).

- Madrid, río Manzanares, Dep. Viveros, 1 ad. posado en la represa y vuela sobre el río el 20.VI (J. Ruiz).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 3 ad. y 4 jov. el 16.VII (J. Ruiz).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ad. y 2 jov. moviéndose entre el carrizal y el tarayal el 20.IX (J. Ruiz).

- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, 1 ad. sale del carrizal el 27.IX (J. Ruiz).

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, río Tajo a la altura de la Barca de Añover, 2 ej. el 12.I.2002 (B. Molina y E. Escudero/SEO-Monticola).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ad. en plumaje de verano el 21.V (G. Martín García y A. H. Ortega).

Citas anteriores a 2003

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 2.VI.2002 (M. Fernández/Naumann).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, dormitorio con más de 200 ind. el 3.I (D. González).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. en la cola del embalse el 2.III y 14 ej. el 9.III (D. Díaz Díaz).

- Soto del Real, un bando de 80-100 ind. en una dehesa con ganado el 16.IV (D. Díaz Díaz).

- Colmenar Viejo: unos 100 ind. alimentándose en prados el 16.IV (C. Andrés Barrera); cerca de 300 ej. en una charca el 10.VII (C. Andrés Barrera).

- Algete, gravera del Duque de Albuquerque, más de 250 ind. entran al atardecer durante 15 minutos el 26.IV (D. González).

- Collado Villalba, vía pecuaria a El Escorial, 20 aves alimentándose en unos pastizales el 12.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, 1 ad. volando hacia el centro del monte el 27.V (C. Andrés Barrera).

- San Fernando de Henares, lagunas de Cerro Gordo, unos 700 ind. en el dormitorio el 4.XI (G. Martín García y C. Gutiérrez Expósito).

Corrección: En el *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid* (Del Moral *et al.* 2002, pág. 78), se cita por error la cría en las cercanías de Colmenar de Arroyo, donde hasta la fecha de redacción del texto (2002) sólo se conocían referencias de observaciones invernales (J. Seoane).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 24 ind. el 4.IX (D. González).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, importantes cifras a finales de agosto, con un censo de 27 aves el 18.VIII y máximo anual de 41 ej. el 21.VIII (G. Martín García).

- Aranjuez, confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 1 ej. el 12.I (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 104 (VK43).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Las Infantas, 2 aves en vuelo sobre el río Tajo el 19.I (G. Martín García, M. M. Araujo y M. Rodero).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escaso, lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Manzanares El Real, prado de la Jarosa, se localiza un dormitorio durante el invierno, con 10 aves el 28.I; durante el invierno 2003-2004 el número se amplía con-

siderablemente, localizándose 29 aves el 10.XII (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ej. posados en la orilla el 17.V; 1 ad. en plumaje nupcial posado junto a una Cigüeña Blanca en el arroyo Mediano el 31.V; 3 ad. y 3 inm. en el arroyo Mediano el 9.VII; 4 ej. posados en el arroyo Mediano el 22.VII (J. Ruiz); 21 ej. en la desembocadura del río Samburiel el 21.VIII, con un total de 23 ind. en el embalse (G. Martín García).

- Madrid, embalse de El Pardo: 1 ad. el 27.V (C. Andrés Barrera) y 20 ind. el 24.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ad. en plumaje nupcial y 1 subadulto descansando en la ribera del río Jarama el 31.V (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, arroyo de El Batán, 1 ad. posado en la orilla el 1.VI (J. Ruiz).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. sale del río Henares el 29.VI; 1 ej. en vuelo hacia el sur, en la misma zona el 26.VII (J. Liarte).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 15 ad. el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola); 16 ej. el 9.IX (D. González).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 8 ej. posados en la orilla el 22.VII (J. Ruiz).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, lac. Especie en clara expansión por toda la provincia.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (Díaz *et al.* 1994); en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Velilla de San Antonio, río Jarama, 1 ej. el 22.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. el 23.III (J. J. Díaz y N. Millán).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave en vuelo el 25.IV (G. Martín García y M. M. Araujo).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera observación, 1 ave en vuelo el 29.III (G. Martín García).

- Madrid, Ciudad Universitaria, facultad de Biología, 1 ave vuela hacia el oeste el 27.V (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, se observan aves ad. y jov. durante todo el mes de agosto, con

máximo de 3 aves el 5.VIII (G. Martín García); 1 jov. posado en la orilla el 24.VIII (J. Ruiz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 25.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p, Ira.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se localizan 11 pp. de las cuales 8 inician la reproducción y sacan adelante 21 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ad. vuela a media altura hacia el noreste el 9.II (J. Ruiz).

- Alcalá de Henares, paso prenupcial: Cerro Malvecino, 1 ad. el 12.II río abajo en compañía de 5 cigüeñas blancas se dirigen al basurero, donde es fotografiada y posiblemente el mismo ej. es visto al día siguiente río arriba (J. J. Díaz, J. Prieto y N. Millán); Casa del Llano, 1 ej. el 13.III; Gurugú, 1 ej. el 13.III; La Oruga, 2 ej. el 23.III (J. Prieto); paso postnupcial, casco urbano, 1 ej. volando bajo entre cigüeñas blancas el 5.IX (J. Prieto); La Alvega, 6 ej. en dirección suroeste el 3.X (COAMB); El Encín, 1 ej. el 10.X (J. J. Díaz).

- Colmenar de Oreja, 2 ej. en migración hacia el norte el 12.III (J. Cano).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, junto a la presa, 2 ej. vuelan con dirección hacia el norte el 4.IV (J. Ruiz).

- Meco, 4 ej. en vuelo de remonte junto a buitres negros y milanos negros, el 30.VIII (J. Liarte).

- Madrid, embalse de El Pardo, 13 ej. el 11.IX (C. Andrés Barrera).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, río Samburiel, 1 ad. el 21.VIII (J. L. Bustos y R. Bustos).

- Colmenar Viejo, cerro de la Marmota, máximo de 18-19 ej. el 20.IX (J. Castro).

- Los Santos de la Humosa, 2 ad. cerca del río en vuelo bajo hacia el sur el 4.X (J. Liarte).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Censo de la población de Alcalá de Henares: se censan 90 pp. reproductoras, todas en edificios del casco urbano salvo una en El Encín. Inician la incubación 87 pp., de las que 71 tienen éxito en la cría y sacan adelante 165 pollos, lo que da un éxito reproductor de 1,96. Un total de 34 pollos cayeron al suelo en los primeros vuelos (P. Prieto y COAMB).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 250-300 ad. posados en la orilla el 2.II (J. Ruiz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, concentración premigratoria importante, 521 ind. el 21.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcalá de Henares, El Val, 9 ej. en vuelo hacia el norte el 27.II (J. Prieto).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ad. en plumaje nupcial el 2.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ad. volando el 4.X (J. J. Díaz).

Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2003

- Madrid, embalse de El Pardo, 2 jov. comiendo en el agua el 28.VII.2002 (F. J. Ortega Pinilla).

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Esta especie se va a excluir a partir del año 2003 del Listado de Rarezas (De Juana *et al.* 2002).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ad., tal vez escapado de cautividad, aunque vuela perfectamente, no porta anillas y es bastante desconfiado, entre el 2.IV y el



Cisne Vulgar (*Cygnus olor*) en la laguna artificial Soto Mozanaque (Algete) el 4 de abril (foto: D. González).

20.VII; 1 ej. el 4.XI (M. Juan/SEO-Monticola, D. González, G. Martín García y M. M. Araujo).

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, junto al puente, 1 ad. comiendo en la orilla el 13.XII (J. Ruiz).

Ánsar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ánsar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 4 aves el 3.I (G. Martín García); un bando de 34 aves llega desde el SE y se sedimenta en el embalse durante una hora, abandonando el lugar hacia el noreste el 28.I (G. Martín García); un grupo de 80-85 aves en vuelo por la mañana y posadas al atardecer en la orilla del embalse el 31.I (A. H. Ortega Morejón); 32 ej. vuelan en V a baja altura hacia el nordeste el 2.II (J. Ruiz); fuerte paso migratorio, 170 aves sedimentadas en el embalse y sendos bandos de 300 y 100 aves en vuelo hacia el este el 1.III (G. Martín García); 21 ind. el 1.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 1 ind. descansa en el agua el 5.III (D. Díaz Díaz); 1 ad. comiendo en la orilla el 29.XI (J. Ruiz).

- Piñuécar, embalse de Puentes Viejas, 1 ind. el 5.I (Ó. Martín Díaz y M. A. Bermejo).

- San Martín de la Vega, gravera de Soto Pajares, 2 ej. el 11.I (E. Castillejos).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 15 ind. el 11.I (M. Juan/SEO-Monticola e I. Pérez); 2 ind. el 9.II (D. González, I. Alonso Hernández y C. Hernández), que siguen en la laguna el 16.II (D. González).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 11 ind. descansado en el agua el 28.I y 3 ind. el 2.III (D. Díaz Díaz); 10 aves se alimentan y descansan en la orilla el 3.II (G. Martín García); 2 aves el 9.II (L. Bolonio).

- Colmenar Viejo, Navalcaballo, bando de 36 ej. el 29.I; 15 ej. el 2.II (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).

- Buitrago del Lozoya, embalse de Riosequillo: unos 300 ind. el 30.I (Ó. Martín Díaz y D. Serrano Labrador); unos 150 ind. el 4.II (Ó. Martín Díaz).

- Somosierra, puerto de Somosierra, 80 ind. intentan cruzar el puerto hacia el norte pero se dan la vuelta por el fuerte viento el 30.I (Ó. Martín Díaz y D. Serrano Labrador).

- Horcajo de la Sierra, cerca de La Nava, 43 ind. volando hacia el norte el 5.II (Ó. Martín Díaz).

- Soto del Real: unos 60 ej. vuelan en dirección norte al amanecer el 5.II y 6 ind. el 11.II (D. Díaz Díaz); 1 ave en el embalse de Santillana el 17.III (G. Martín García).

- Navacerrada: grupo de 80-90 aves se pierde volando tras Siete Picos el 11.II (D. Palomino); cercanías de la pista forestal entre El Ventorrillo y el puerto de Navacerrada, grupo de 80-90 ind. en vuelo de sur a norte el 11.II (D. Palomino).

- Colmenar Viejo, casco urbano, bando de 21 ind. el 5.III (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, 7 ind. volando en círculos se dirigen a El Porcal el 24.III (E. Castillejos).

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 3 aves entre el 8.III y 15.III (Ó. Llama y M. González/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 h. volando junto a azulones el 21.VIII (G. Martín García); 2 ad. nadan junto a la depuradora el 24.VIII (J. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Madrid, embalse de El Pardo, 3 ej. el 10.XII (C. Andrés Barrera).

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: Ira e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ej. el 6.I (R. Lacruz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 h. ad. junto a ánades frisos el 8.III (G. Martín García, J. Martínez de Aramayona y P. Tapia); 1 pp. el 22.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola, G. Doval y G. Martín García); 1 h. el 25.IV (G. Martín García); 3 jov. el 19.VIII, 4 jov. el 21.VIII y 2 jov. el 27.VIII (G. Martín García).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: les, p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 aves (1 m. y 1 h.) el 3.I y 1 m. el 3.II (G. Martín García); 1 pp. el 27.II (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro); 2 m. y 2 h. el 1.III (G. Martín García); 1 pp. el 2.III y el 9.III (D. Díaz Díaz y J. Ruiz); 1 m. el 24.X (M. Higuera, S. Pérez-Cuadrado, J. Rivero y C. de Miranda); 1 h. ad. el 28.XII (J. Ruiz).
- Madrid, parque Juan Carlos I: 6 m. ad., 1 m. jov. y 1 h. el 11.I (M. Juan/SEO-Monticola e I. Pérez); 2 m. ad., 1 m. jov. y 1 h. entre el 18.I y el 2.III (D. González, S. Pérez-Cuadrado, G. Solís y M. Higuera).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 3 pp. el 18.I, 1 m. el 9.II, el 21.II, el 23.II, el 1.III y el 2.III; grupo de 4 m. y 5 h. el 16.III (D. González, M. Juan/SEO-Monticola, G. Martín García, M. Rodero, M. M. Araujo y V. Merino Jiménez).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 3 aves (1 m. y 2 h.) el 19.I (G. Martín García, M. M. Araujo y M. Rodero).
- Alcorcón, parque Ciudad de Mayarít, 1 h. el 27.I (J. D. Acevedo).



Silbón Europeo (*Anas penelope*) en el parque Juan Carlos I (Madrid) el 12 de enero (foto: D. González).

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 67 aves (28 m. y 29 h.) el 16.III (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, junto a la depuradora, 1 m. ad. en eclipse el 2.XI (J. Ruiz).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. en eclipse el 20.XII (J. Ruiz).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, lco.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

Sin citas de interés.

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, grupo de 20 ind. el 12.I (D. González).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, última observación primaveral, 2 aves el 21.IV (G. Martín García).
- Madrid, El Pardo, embalse, 1 m. el 4.VI (G. Martín García y M. M. Araujo).
- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, 3 aves el 2.IX (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita postnupcial, 6 aves el 4.IX (D. González).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada.

Sin citas de interés.

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 12 m. y 10 h. el 17.I (E. Castillejos); primera cita postnupcial, 1 h. el 28.IX (M. Juan/SEO-Monticola); 8 ej. el 6.XI (C. Andrés Barrera); 1 h. el 9.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 14 m. y 11 h. el 7.XII (J. L. Fuentes Serrano/Naumannii).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 pp. el 27.II (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro); 11 ind. (6 m. y 5 h.) el 1.III (G. Martín García); 3 m. y 2 h. el 2.III (D. Díaz Díaz, G. Martín García, M. Rodero, M. M. Araujo y V. Merino Jiménez); y 1 m. en plumaje nupcial alimentándose en el río Guadalix el 5.IV (J. Ruiz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 5 m. y 3 h. el 28.II (D. Díaz Díaz); bando de 35 aves el 1.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 34 aves (17 m. y 17 h) el 2.III (G. Martín García, M. Rodero, M. M. Araujo, V. Merino Jiménez, D. Díaz Díaz y J. Ruiz); y 11 aves el 3.III (A. H. Ortega Morejón).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, 1 m. el 16.III (G. Martín García).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. el 27.XI (D. González).
- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. el 29.X (F. Martín Martín/SEO-Monticola); 4 h. y 2 m. nadan en grupo el 1.XI (J. Ruiz).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa cercana a RNE, 1 m. el 16.III (J. Ortas).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 m. y 1 h. el 19.III (D. Díaz Díaz); 1 m. ad. alimentándose en el río Guadalix el 2.V (J. Ruiz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: grupo de 26 m. y 10 h. realizando el cortejo y volando en grupo de 6-10 ind. sobre la laguna el 16.III (D. González y G. Martín García); 1 m. el 23.III (D. González) y el 25.IV (G. Martín García y M. M. Araujo).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: última observación primaveral, 6 aves el 25.IV (G. Martín García) y primera observación postnupcial, 1 m. en eclipse el 21.VIII (G. Martín García).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 pp. el 28.V (J. Ruiz).

- Madrid, embalse de El Pardo, 2 m. y 1 h. el 4.VI (G. Martín García y M. M. Araujo).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 4.IX (D. González).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, unas 350 aves el 7.XII (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa cercana a RNE: 4 m. y 6 h. el 9.I; 24 ind. el 11.I y el 12.I; 20 m. y 16 h. el 26.I; 3 m. el 27.II; 9 aves (5 m. y 4 h.) el 19.III; 6 m. y 4 h. el 23.III; 12 m. y 6 h. el 22.IV; 20 m. y 4 h. el 29.IV; 8 m. y 1 h. el 18.V; 20 m. y 1 h. el 26.V; 41 m. la mayoría mudando a plumaje de eclipse, 5 h. y 3 pollos el 8.VI; 90 m. en plumaje de eclipse y 15 h. el 23.VI; 118 m. en plumaje de eclipse y 22 h. el 8.VII; cifra máxima censada, 146 ej. el 21.VII; 106 ej. el 31.VII; 24 m. en plumaje de eclipse y 22 h. el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola, D. González, G. Martín García, E. de Juana, E. Castillejos, J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. L. Fuentes Serrano/Naumanni, C. Álvarez Usategui y M. Rodero).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 3 aves (2 m. y 1 h.) el 19.I (G. Martín García, M. M. Araujo y M. Rodero).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 m. y 2 h. el 28.II (D. Díaz Díaz).
- San Martín de la Vega, 1 ej. en el río Jarama el 29.III (B. Molina/SEO-Monticola).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

Sin citas de interés.

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 2 m. el 4.I, y 2 m., 1 m. jov. y 1 h. el 6.I (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, balsa cercana a RNE: 2 h. el 11.I (E. Castillejos); 1 h. el 12.I (D. González).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 h. el 27.XI (D. González).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: Ico.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 m. el 25.IV, 1 m. en plumaje de eclipse el 21.VII y el 25.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Madrid, río Manzanares, Dep. Viveros, 2 m. y 2 h. nadan en parejas y se zambullen el 20.VI (J. Ruiz).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 m. el 25.VII, 40 aves el 26.XI y 50 el 19.XII (J. Fernández, J. C. Álvarez y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2003

- Algete, Soto Mozanaque, 1 ej. en una pequeña gravera el 3.V.1992 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 h. aparentemente híbrida con Porrón Moñudo entre el 4.I y el 26.I (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente

te escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. en plumaje de invierno entre un grupo de fochas el 3.XI (G. Martín García). Cita homologada por el Comité de Rarezas (G. Martín com. pers.).

Malvasia Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera el Raso, 1 m. el 26.X, el 26.XI y el 13.XII (F. Martín Martín y J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 3 ej. el 28.III (J. J. Díaz y Ó. Cabello); y 1 ind. el 8.IX (J. Herrera).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 1 ej. el 2.V (J. J. Gamonal, I. Vega y J. L. Martínez/SEO-Monticola).

- Nuevo Baztán, arroyo Vega, 3 ej. el 9.V (COAMB).

- Cercedilla, falda de los Miradores, 1 ind. ciclea por encima del pinar, observado en varias ocasiones entre el 16.V y el 29.V (I. Sevilla y otros). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 18 (VL01).

- Tielmes, 1 ind. el 26.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, El Encín, 25 ej. el 23.VIII, 15 el 5.IX y 10 el 6.IX (J. J. Díaz).

- San Fernando de Henares, 1 ej. el 20.X (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s muy escaso y reproductor ocasional, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Brunete, afueras de la población por la M-501, 1 ad.

posado en un tendido de teléfono el 24.II, y se repite la misma observación el 7.IX y el 9.XII (I. Sevilla).

- Villa del Prado, 1 ind. el 14. XII (J. C. Atienza/GEAC y G. P. Farinós).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P, lac.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares: 1 ind. el 18.II (J. J. Díaz y F. Calleja); 20 ind. el 24.II (J. C. Rincón, D. Almonacid y G. Astudillo); 16 ind. el 25.II, 24 el 26.II, 754 el 17.III, 367 el 24.III, 292 el 25.III, 60 ej. el 17.VII (COAMB); y 94 ej. el 27.VII (J. J. Díaz).

- Boadilla del Monte, desvío de la M-40, 1 ind. vuela por encima de la carretera el 24.II (I. Sevilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: primera observación del año, 1 ind. el 1.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González); 2 ind. volando el 4.III (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 30-35 ej. ciclean alto y toman dirección SO-NE el 5.III (J. Ruiz).

- San Martín de la Vega, La Boyeriza, 1 ej. el 6.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, entre Casa Eulogio y la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, 14 ind. el 7.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 pp. construyendo el nido el 4.V (J. Marchamalo, J. A. López Septiem, J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 64 (VK57).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Daganzo de Arriba, varios ej., el 2.IV (C. Andrés Barrera).

- Algete, finca Soto Mozanaque: 1 ind. el 13.IV (D. González); primera cita postnupcial en el área, 1 jov. el 20.VII (M. Juan/SEO-Monticola); 1 ej. el 9.IX (D. González).

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 4.IV y el 3.X (COAMB).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ad. el 8.VI (J.

Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 43 (VK69).

- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 ad. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p, lac. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcalá de Henares, el Gurugú, 1 ad. el 13.III (C. Cuesta y J. J. Díaz).

- Quijorna, 1 ave de segundo año el 11.IV (F. Martínez Olivas).

- Manzanares El Real, Centro de Educación Ambiental, 1 ad. vuela a gran altura en dirección NE el 30.IV (D. Díaz Díaz).

- Pinilla de El Valle, 1 inm. el 10.V (SCV).

- Miraflores de la Sierra, La Morcuera, 1 ad. volando a gran altura junto con 5 buitres leonados y 1 buitre negro el 8.VI, desciende a coger algo del suelo y desaparece entre las repoblaciones de pino (J. Fernández García y B. Rodríguez Merayo).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Alcorcón, Venta la Rubia-Cuatro Vientos, 1 ej. cicleando el 12.III (F. J. Ortega Pinilla).

- Alcalá de Henares, casco urbano, 1 ej. el 18.III y el 4.IV (COAMB).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. el 28.IV (COAMB).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, paso otoñal, 1 ej. el 4.IX, 1 ej. posado en el monte Ecce-Homo el 8.IX, 10 ej. el 9.IX, 22 el 23.X y 7 el 2.XI (COAMB).

- Madrid, Aravaca, frente a clínica La Zarzuela, 12 aves cicleando a baja altura el 7.IX (R. Riquelme).

- San Fernando de Henares, casco urbano, 1 ind. el 5.X (J. Marchamalo y J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Buitre Moteado (*Gyps rueppellii*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 49:155).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se localizan 76 pp., inician la reproducción 64 pp. y sacan adelante 45 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 2 ej. el 27.I, 1 el 27.II, 1 el 25.III, 1 el 8.IV, 2 el 11.V, 2 el 4.IX y 1 el 19.IX (COAMB).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, embalse de Picadas, 1 ej. el 15.II (J. J. Díaz, N. Millán, C. Cuesta y P. Calzada).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 1 ej. el 3.III (J. J. Díaz) y 1 ind. el 12.III (C. Cuesta y E. Estalrich).

- Colmenar de Oreja, río Tajo, primera cita, 1 ej. el 12.III (J. Cano).

- Rascafría, primera observación, 1 ej. el 13.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Bustarviejo, La Porquizuela, primera observación del año, 1 pp. volando el 17.III (D. Díaz Díaz).

- Villa del Prado, encinares del SO del municipio, 1 ej. el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 83 (UK85).

- Santorcaz, 1 pp. el 24.V, 1 ej. de fase clara posado 8.VI, 1 ej. de fase oscura cazando 15.VI, 1 ej. posado en un poste el 14.VIII (A. Doncel). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 55 (VK88).

- Madrid, barrio de Canillejas, 1 ind. sobrevolando el 13.IX (L. del Castillo).

- Alcalá de Henares, 2 ej. el 17.IX (COAMB).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, carrizal de Las Madres, al menos 81 ind. entran a dormir el 11.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, migración pre-nupcial, 2 ej. el 5.III y 1 el 18.III; migración postnupcial, 1 ej. el 3.IX y el 26.IX (COAMB).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. el 11.IX (C. Andrés Barrera).

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, carrizal de Las Madres, al menos 50 ind. entran a dormir el 12.I.2002 (B. Molina y E. Escudero/SEO-Monticola).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 m. los días 5.III, 14.III, 25.III, 26.III y 8.IV (COAMB).
- Los Santos de la Humosa, 1 h. el 26.IX (COAMB).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Alcalá de Henares: 1 m. el 24.III (C. Cuesta, F. J. Pastor y J. J. Díaz); y 2 m. el 3.IV (J. Prieto).
- Getafe, arroyo Culebro: primera cita del año, 1 m. el 1.IV (M. Juan y G. González Fernández/SEO-Monticola); 1 h. el 6.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Daganzo de Arriba, cita temprana, 1 m. y 1 h. el 2.IV (C. Andrés Barrera).
- Getafe, 1 ej. el 3.IV (J. Cano).
- Algete, Llano del Campo, 1 m. en vuelo de caza sobre lindes de campos de cultivo el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Daganzo de Arriba, alto de Valvieja, 1 inm. en migración hacia el norte el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Galapagar, 1 pp. se reproduce y saca 1 pollo; la relación tamaño de puesta/pollos volados es 4/4 en 2001, 2/1 en 2002 y 1/1 en 2003 (G. Núñez-Lagos y S.

Jiménez Gil). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (VK18).

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares: paso prenupcial, 1 ej. el 30.III (J. Prieto) y el 8.IV (COAMB); paso postnupcial, 3 ind. el 12.IX y 1 ej. el 16.IX (COAMB).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, río Tajo, 8 ej. juntos al atardecer el 18.I (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, pinares de La Marañosá, 1 ind. el 31.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 77 (VK56).

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se localizan 23-24 pp., inician la reproducción 23 pp. y sacan adelante 28 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se localizan 15 pp., inician la reproducción 10 pp. y sacan adelante 10 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid).
- Santorcaz, 1 ej. el 25.I, 1 pp. ataca y expulsa a un Busardo Ratonero el 2.V, 1 ind. el 23.VIII y el 13.IX (A. Doncel).
- Alcalá de Henares: casco urbano, 1 subadulto el 27.II; Ecce-Homo, 1 subadulto el 14.III, 1 pp. de ad. el 8.IX y el 23.X, 1 ad. el 2.X; casa de oficios, 1 h. ad. el 17.III (COAMB). Este año aumentan mucho las citas de adultos en el este de la Comunidad, reflejo de la actual expansión de la especie en la zona.

- Madrid, Soto de Viñuelas, 1 ad. posado en una encina el 15.III (C. Andrés Barrera).
- Daganzo de Arriba, alto de Valvieja, 1 inm. en vuelo alto y directo hacia el norte el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, barranco de La Fuentecilla, 1 h. subadulta el 21.IV (COAMB).
- Daganzo de Arriba, río Torote, 3 ad. y 2 inm. vistos a la vez el 4.X (J. Prieto y P. Alcázar).
- Ambite, 2 ad. ciclean el 13.XII (F. J. Ortega Pinilla).

Aguililla Calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Buitrago del Lozoya, primera cita, 1 ind. de fase oscura el 18.II (Ó. Martín Díaz).
- Rascafría, primera observación, 1 ind. el 13.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, 1 ej. de fase oscura el 17.III (E. Castillejos).
- Alcalá de Henares, parque de los cerros: 1 ej. el 24.III (J. J. Díaz, C. Cuesta y F. J. Pastor); 1 ej. el 11.X (J. J. Díaz).
- Santorcoz, 1 ó 2 ind. vistos desde el 17.IV hasta el 11.X (A. Doncel). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 55 (VK88).
- Rascafría, finca de los Batanes, 1 ind. es acosado por una Corneja negra el 9.X (I. Sevilla y V. Sevilla).

Águila-azor Perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Miraflores de la Sierra, 2 aves el 11.I (M. M. Araujo).
- Aranjuez, Casa Carmena, 1 ej. de primer año el 19.I (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Aranjuez, La Flamenca, 1 inm. vuela sobre campos de cultivo el 23.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Brea de Tajo, Cerrillo de la Cruz, 1 ad. posado en un poste de media tensión es atacado por un Busardo Ratonero y termina alejándose hacia el oeste el 1.III (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).
- Fresno de Torote, 1 jov. el 9.IX (COAMB).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ind. posado en un chopo el 16.III (J. Ortas); 1 ave el 18.X (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en vuelo hacia el norte siguiendo el curso del río el 22.III (J. Liarte).
- Alcalá de Henares: La Oruga, 1 ej. el 23.III (J. J. Díaz y N. Millán); parque de los Cerros, 1 ind. el 24.III (C. Cuesta, F. J. Pastor y J. J. Díaz); Palacio Arzobispal, 1 ej. el 28.III (J. J. Díaz, C. Cuesta y J. Prieto); Ecce-Homo, 1 ej. el 3.IX (COAMB); El Encín, 1 ej. el 12.IX y el 19.IX (J. J. Díaz).
- Pedrezuela, 1 ind. volando sobre el río Guadalix cerca del embalse el 6.IV (J. Ortas).
- Daganzo de Arriba, río Torote: 1 ad. el 10.IV (COAMB) y 1 jov. el 14.VIII (J. J. Díaz).
- Villavieja del Lozoya, puerto de Linera, 1 ind. el 2.IX (Ó. Martín Díaz y D. Serrano Labrador).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 1 ej. el 20.IX (J. Miranda).
- Pinilla de El Valle, cola del embalse de Pinilla: 2 aves el 1.X (J. de la Puente/SEO-Monticola); 1 ej. el 27.X, el 28.X y el 29.X, 2 ej. el 30.X y el 1.XI, 3 ind. el 2.XI; 2 ej. el 3.XI y el 4.XI (F. Jáñez y O. Alonso).
- Madrid, El Pardo, 1 ind. sobrevuela el embalse junto a la presa de Mingorrubio y se lanza en picado el 4.X (C. Sánchez Delicado).
- Rivas-Vaciamadrid, confluencia de los ríos Jarama y Manzanares, 1 ind. cicleando el 5.X y 1 ind., tal vez el anterior, posado en un árbol de una isleta de las graveras de El Porcal el 7.X (E. Castillejos).

Citas anteriores a 2003

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 1 ave el 6.IV.2002 (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).

Cernicalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se censa un total de 234 pp. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Alcalá de Henares, censo del año 2003: 29-31 pp. de

las que 23 tienen éxito en la cría, volando 59 pollos, lo que da una productividad parcial de 2,57 y total de 2,03. Se observaron 12 nidos con 3 pollos y 2 nidos con 4 pollos. La población descendió respecto al 2002. Los pollos volaron entre el 12.VII y el 28.VII. Como curiosidad destaca la presencia durante los meses de abril y mayo de 1 m. inm. de Cernícalo Vulgar en el silo, que se dedicó a perseguir y atacar a los cernícalos primillas continuamente. Como resultado sólo se quedaron a criar 2 de las 5 pp. que iban a hacerlo. Diferenciamos tres núcleos en la colonia: Palacio Arzobispal-Convento de las Bernardas 21-22 pp., iglesia de Santa María 6-7 pp. y silo 2 pp. (COAMB).

- Alcalá de Henares: Palacio Arzobispal, 1 h. el 24.II y 1 m. el 26.II; iglesia de Santa María, 1 m. el 25.II y el 27.II (J. Prieto).

- Rascafría, puerto de la Morcuera, 2 m. cazando insectos en prados y pjalnal el 6.VII (M. Juan y P. Campos Rus/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares, este año se confirma el regreso a primeros de septiembre de un grupo de cernícalos primillas a la colonia que permanecen en ella hasta finales de octubre; estimaciones: 10-12 aves el 5.IX, 7-10 el 10.IX, 10-15 el 11.IX, 12-15 el 20.IX, 7-10 el 28.IX, 5 el 3.X, 1 el 6.X y 1-2 el 22.X (COAMB).

Cernícalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Cernícalo Patirrojo (*Falco vespertinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: les, p.

Criterio: fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Brunete, urbanización Valle de los Rosales, 1 ave el 8.I (J. Calle). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 60 (VK17).

- Valdilecha, 1 h. el 5.IV (G. González Fernández y M. Juan/SEO-Monticola).

- Algete, última observación, 1 h. el 6.IV (J. Ortas).

- Meco, 1 ind. en vuelo bajo sobre rastrojos de campos de cereal el 11.X (J. Liarte).

- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 h. de segundo año abatida por disparo el 13.X (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Valdetorres de Jarama, arroyo Valtorón, primera cita postnupcial, 1 m. y 1 h. o jov. el 19.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ind. el 28.XII (F. Ávila). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 43 (VK69).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

- Nuevo Baztán, arroyo Vega, 1 ej. el 9.V (COAMB).

- Santorcaz, 1 ind. el 13.IX (A. Doncel).

- Daganzo de Arriba, 1 ej. el 4.X (J. Prieto y P. Alcázar).

Citas anteriores a 2003

- Daganzo de Arriba, arroyo de Valseco, 1 ej. cazando insectos en vuelo el 17.X.1987 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ad. el 26.IV.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Ajalvir-Paracuellos de Jarama, arroyo de las Culebras, 1 ej. cazando insectos en vuelo el 8.VI.1991 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se localizan 34 pp., inician la reproducción 24 pp. y sacan adelante 25 pollos (Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, casco urbano: 1 ej. vuela a la altura del n.º 325 de la calle de Alcalá (metro Quintana), en pleno centro de Madrid el 23.II (J. Prieta); plaza de Callao, 1 ad. el 11.VI (F. J. Ortega Pinilla).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, lac, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Getafe, primera observación el 30.III (J. Cano).

- Aranjuez, Sotomayor, primera cita prenupcial, 1 m. oído el 1.IV (M. Juan y G. González Fernández/SEO-Monticola).

- Titulcia, 1 m. cantando el 3.IV (R. Moreno-Opo).

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: observaciones en cuadrículas sin indicios de reproducción.

- Villa del Prado, carretera hacia El Alamin, 1 h. atropellada el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 83 (UK85).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Santorcaz, detectado a lo largo de todo el año (A. Doncel). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 55 (VK88). No estaba citado como invernante en las cuadrículas 54 (VK78) y 55 (VK88).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, captura de 1 jov. para su anillamiento el 26.X (GEAC).

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas de interés.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ad. el 22.X (R. Ramos y E. Navarro).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, un total de 417 aves el 16.VIII (A. Pérez Menchero y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.

- Meco: 1 ej. en vuelo alto remontando con dirección suroeste el 11.I (J. Liarte); 2 aves posadas en una charca temporal en cultivos de cereal el 2.III (L. Rodríguez Rodríguez).

- Aranjuez, prados de Las Infantas: 47 ej. vuelan hacia el oeste el 11.I (B. Molina/SEO-Monticola); un bando de 5 aves en vuelo el 19.I (G. Martín García, M. M. Araujo y M. Rodero).

- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, bandas de 57, 58 y 72 ind. en media hora volando al nordeste el 3.II (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).

- Alcalá de Henares: plaza de Cervantes, 2.444 ej. en 19 bandos pasan en 2 horas el 27.II (COAMB); casco urbano, 155 ej. al anochecer del 15.X (J. Prieto),

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros: 3 ej. el 24.III (C. Cuesta, F. J. Pastor y J. J. Díaz); 80 ej. el 10.XI (COAMB).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 97 ej. el 15.X (COAMB).
- Soto del Real, un bando de más de 100 ind. vuela en dirección sur el 15.X (D. Díaz Díaz).

- Valdemoro, sendos bandos constituidos por 109 y 42 ej. en paso otoñal el 15.X (J. Cano).

- Colmenar Viejo, casco urbano, 17 ind. el 8.XI y unos 30 ind. el 10.XII volando hacia el monte de El Pardo (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).

- Madrid, Chamberí, bando de 50 ind. volando al sur el 11.XII (F. J. Ortega Pinilla).

Citas anteriores a 2003

- San Martín de la Vega, 90 aves vuelan hacia el oeste el 22.XII.2002 (B. Molina/SEO-Monticola).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, Valdepastores, bando de unos 350 ej. junto con unas 50 gangas ibéricas se levantan de un erial el 23.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Getafe, base aérea, se obtiene un total de 17 ej. en un censo realizado el 20.II y una cifra de 86 ej. el 7.XII, lo que confirma su descenso con respecto a temporadas anteriores (J. Cano).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2003: se censan 840 ind. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Aranjuez, arroyo de los Huesos, 7 m. el 16.II (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 111 (VK32).

- Santorcaz, 1 m. en vuelo el 24.XII (A. Doncel). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 55 (VK88).

Ostrero Común (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 6 ind. el 3.III (J. Ruiz Rodrigo).

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita anual de 1 m. el 8.III, 3 ej. el 14.IX, y última cita postnupcial, 1 m. el 21.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 3 ej. el 15.III (J. Ruiz).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: lac, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Soto del Real, embalse de Santillana, 2 aves el 7.IV (G. Martín García).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 6 ej. el 22.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola, G. Doval y A. H. Ortega); 2 ad. el 29.VII (G. Martín García).

- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, grupo de 32 ej. el 26.XI (F. Martín Martín y J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2003

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ej. el 14.V.1994 (M. Juan/SEO-Monticola).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor, les.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, primera cita del año, varios ind. cantando al amanecer el 1.III (M. Juan, B. Molina y L. Pokorny/SEO-Monticola).
- Villa del Prado, Casa de Don Cirilo, 1 ej. canta en viñedos el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p, lac

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 ind. el 21.II y 7 el 23.II, un mínimo de 15 ind., algunos jov., el 23.VIII (D. González); última cita en paso, 1 ind. el 19.X (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: primera observación de 2 aves el 1.III y máximo anual de 71 aves el 21.VIII (G. Martín García); última cita postnupcial, 7 ind. el 5.X (M. Juan Martínez/SEO-Monticola y D. González).
- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en campo encharcado junto al río el 2.III (J. Liarte).

Chorlito Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ad. el 26.III, 6 aves en vuelo el 15.IV, 1 ad. el 25.IV, 1 jov. el 3.IX y 2 jov. el 8.IX (G. Martín García).
- Madrid, embalse de El Pardo, grupo de 14 aves el 4.VI (G. Martín García y M. M. Araujo).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 ad. posadas en una orilla de limos el 7.VI (J. Ruiz).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 21.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Chorlito Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 h. ad. entre otros chorlitejos el 26.III (G. Martín García); 2 aves el 27.IX (L. del Castillo).

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, 11 aves en pastizales junto a la N-IV el 11.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- Aranjuez, vega del río Tajo, observaciones de 3, 1 y 24 ej. el 12.I (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 104 (VK43).
- Aranjuez, Las Infantas, al menos 12 aves junto a avefrías el 19.I (G. Martín García, M. M. Araujo y M. Rodero).
- Aranjuez, Loma Culebra, más de 250 ej. mezclados con algunas avefrías en terrenos de regadío el 16.II (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 115 (VK31).
- Aranjuez, más de 160 ej. en siembra nacida de regadío el 16.II (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 111 (VK32).
- Getafe, base aérea, 19 ej. posadas sobre un barbecho de cebada el 20.II (J. Cano).
- Aranjuez, Valdepastores (cuadrícula 115, VK31), al menos 3 ej. entre un bando de unas 250 avefrías y unos 20 estorninos negros se alimentan en un erial el 23.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Meco, grupo de 15 aves posadas en una zona de cultivos de cereal encharcados el 2.III y el 3.III (L. Rodríguez Rodríguez).

- Valdeterres de Jarama, campos de cultivo con encharcamientos, 1 ind. el 22.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, cola del embalse de Valmayor, 1 ad. en plumaje de invierno posado en la orilla el 26.V (J. Ruiz).

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Aranjuez, vega del río Tajo, numerosos ej. el 12.I (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 104 (VK43).

- Aranjuez-Colmenar de Oreja, vega del río Tajo, en un tramo de 3 km de la margen izquierda, concentración de unos 1.500 ej. el 13.II (J. Cano).

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 130 ej. el 27.II (C. Cuesta y J. J. Díaz).

- Daganzo de Arriba-Carmar de Esteruelas, arroyo de Valmediano, hasta 5 ej. acosan a 1 Busardo Ratónero y 1 h. de Aguilucho Pálido el 8.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 9 ind. el 23.VIII (D. González).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ad. en plumaje de invierno asociada a 2 chorlitejos chicos el 7.IV (G. Martín García).

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: lac, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 jov. comiendo en la orilla el 18.VIII (J. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 23.VIII, 2 aves el 28.VIII y 1 ej. el 4.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 jov. asociado a correlimos comunes el 2.IX (G. Martín García y A. H. Ortega).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ad. en plumaje de verano posado en una orilla de limos el 7.VI (J. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 ej. el 28.VIII (D. González).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. en plumaje de invierno el 23.III, 2 jov. el 4.IX y 3 ind. el 9.IX (D. González); 1 ej. el 30.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- El Escorial, cola del embalse de Valmayor, 1 ad. posado en una piedra el 21.V (J. Ruiz).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 aves con caracteres de la subsp. *alpina* en plumaje de verano el 21.IV (G. Martín García); 1 ad. junto a la depuradora el 18.VIII (J. Ruiz); 1 ad. con caracteres de la subsp. *schinzii* el 27.VIII (G. Martín García); y 1 ej. el 11.IX (C. Andrés Barrera).

- Soto del Real, embalse de Santillana: 1 jov. el 19.VIII y el 21.VIII, 5 aves (4 jov. y 1 ad.) el 2.IX (G. Martín

García y A. H. Ortega) y 2 jov. el 8.IX (G. Martín García).
 - Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 2 ej. el 3.IX (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: lac, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 h. el 2.III (G. Martín García, M. Rodero, M. M. Araujo y V. Merino Jiménez); 2 m. y 2 h. el 14.III (G. Martín García y M. M. Araujo); 2 m. en plumaje de verano y 2 h. el 15.III (D. González); 2 m. y 3 h. el 16.III (D. González y G. Martín García); 1 m. y 2 h. el 19.III y el 24.III (M. Rodero y G. Martín García); 2 m. y 2 h. el 22.III, 9 ind. el 23.III (D. González); 1 h. el 29.III (G. Martín García) y 1 ej. el 23.VIII (D. González).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ave el 3.IX (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 4.IX (D. González).

- Aranjuez, vega del río Tajo, 1 ej. el 12.I (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 104 (VK43).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, les, p, r.



Combatiente (*Philomachus pugnax*) observado en la laguna artificial Soto Mozanaque (Algete) el 15 de marzo (foto: D. González).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, barrio de Salamanca, 1 jov. choca contra una ventana el 27.X (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Madrid, Suances, 1 jov. con un fuerte traumatismo el 14.XI (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 4 ind. el 23.II y 40 ind. el 23.III (D. González); 1 ej. el 5.VII (M. Juan/SEO-Monticola y D. González) y 1 ind. el 23.VIII (D. González).

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 3 aves el 15.IV y 1 ej. el 21.IV (G. Martín García), 1 ave el 22.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval).

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 ind. en plumaje de verano el 16.III (D. González y G. Martín García); 7 ind. el 4.IV, 2 aves el 4.IX y 1 ind. el 9.IX (D. González).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 5 aves el 5.IV (I. Rodríguez y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 9 aves el 7.IV (G. Martín García); 1 ej. el 9.IV (C. Andrés Barrera); 3 ej. el 22.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 5 ej. el 25.IV (G. Martín García y M. M. Araujo); bando de 90-100 ej. el 13.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 2 aves el 21.V (G. Martín



Agujas colinegras (*Limosa limosa*) en la laguna artificial Soto Mozanaque (Algete) el 23 de marzo (foto: D. González).

García); 8 ej. el 11.IV (G. Martín García y A. H. Ortega); y 2 el 15.IV (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. el 23.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- El Escorial, cola del embalse de Valmayor, 1 ad. en plumaje de verano posado en una piedra el 21.V y 9 ad. en plumaje nupcial con igual comportamiento el 26.V (J. Ruiz).

- Madrid, embalse de El Pardo, 1 ave el 4.VI (G. Martín García y M. M. Araujo).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ej. el 21.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 2 ej. el 2.IX (G. Martín García y A. H. Ortega).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A. Para el próximo Anuario esta especie va a ser excluida de la presente Lista al no conocerse ninguna cita en territorio de la Comunidad de Madrid.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 2 ej. el 9.IV (C. Andrés Barrera); 2 ej. el 21.IV, el 22.IV y el 25.IV (G. Martín García, J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 2 ind. el 5.X (D. González y M. Juan/SEO-Monticola); 2 ad. en plumaje de invierno el 4.X y el 23.X, y 1 ad. comiendo en la orilla el 2.XI (J. Ruiz).

- Soto del Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ej. en plumaje nupcial el 15.IV (G. Martín García).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ej. el 23.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 28.VIII (D. González).

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: Ico, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, 16 ad. en plumaje nupcial alimentándose en los limos el 5.VII (J. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera cita postnupcial, 1 ej. el 5.VII (M. Juan/SEO-Monticola); cifra importante, 12 ej. el 28.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, soto Gutiérrez, 1 ej. el 3.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ad. el 20.VII, 1 ej. el 28.VII, 2 ind. el 24.VIII, 1 ave el 28.VIII, 1 ind. entre el 21.IX y el 28.IX, y 1 ej. el 4.X (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ave solitaria el 3.IX (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

Andarrios Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p, les muy localizado.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 44 ind. juntos en una isleta a última hora de la tarde el 28.VIII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: censo completo de 83 ind. el 21.VIII, el máximo censado en este embalse (G. Martín García); 1 ave presente durante el invierno (desde el 10.XII hasta fin de año al menos) en la desembocadura del río Samburriel (G. Martín García). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 29 (VL20).

Vuelvepedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Falaropo Picogrueso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 jov. en plumaje de primer invierno mudando a plumaje nupcial, nada y se alimenta a pocos metros de la orilla el 28.II (D. Díaz Díaz); el ave es observada repetidamente por multitud de personas hasta el 9.III (D. González, M. Juan/SEO-Monticola, A. H. Ortega Morejón, G. Martín



Falaropo Picogruesso (*Phalaropus fulicarius*) en el embalse de Santillana el 6 de marzo
(foto: D. González).

García, M. Rodero, M. M. Araujo, V. Merino Jiménez, A. Rodríguez Pérez y J. Ruiz).

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: Ira que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Veilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos: 1 ad. en plumaje de invierno bañándose con un grupo de más de 5.000 gaviotas reidoras el 3.I, y 1 ad. diferente del anterior por tener la muda más avanzada el 4.I (D. González); 1 ad. en plumaje de invierno el 6.I (G. Martín García).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. mudando a plumaje nupcial el 9.III (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 ind. de primer invierno vuela confiado sobre el agua cerca de la desembocadura del arroyo Samburiel el 28.II (D. Díaz Díaz); el ave es observada repetidamente hasta el 16.III (G. Martín García, M. Juan/SEO-Monticola, D. González, M. Rodero, M. M. Araujo, V. Merino y J. Ruiz Rodrigo).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: s reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. con plumaje de primer verano el 4.V y otro de la misma edad el 9.IX (D. González).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ad. posados, uno de ellos echado, en la zona emergida el 7.VI, 3 ad. y 1 jov. el 19.VI, y 4 ad. en plumaje de verano el 1.VII (J. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 6 ad. volando alto hacia el vertedero el 8.VI (M. Juan/SEO-Monticola).
- El Escorial, embalse de Valmayor, junto al puente, 4 ad. en plumaje de verano el 21.VI (J. Ruiz).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, arroyo Mediano, 30 ej. (28 ad. en plumaje de verano y 2 jov.) el 1.VII y más de 100 ej. el 9.VII (J. Ruiz).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.



Gaviota Enana (*Larus minutus*) observada en el embalse de Santillana el 4 de marzo (foto: E. Fernández Larreta).

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ad. en plumaje de invierno en un grupo mixto de gaviotas reidoras y sombrías el 12.I (D. González); 1 ind. de primer invierno el 9.XI (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave de primer invierno entre gaviotas reidoras y sombrías el 25.XI (G. Martín García).

Gaviota Sombría (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, lab.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Navacerrada, embalse de Navacerrada, unos 30 ind. el 3.II (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera observación postnupcial, 3 jov. y 1 subadulto el 29.VII (G. Martín García).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera cita postnupcial, 1 jov. volando el 31.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

Gaviota Argétea (*Larus argentatus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: Ira, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal: 1 ind. de primer invierno el 26.I (D. González, M. Juan/SEO-Monticola y E. de Juana); primera cita confirmada en Madrid de aves procedentes de las poblaciones mediterráneas (Camarga en Francia e islas Columbretes en Castellón) al portar 2 jov. anilla de PVC, observándose al menos 3 ind. de primer invierno, 1 ind. de tercer invierno y 1 ad. el 9.XI, y 1 ind. de primer invierno y 1 ind. de segundo invierno el 16.XI (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 13.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval).
- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ave de tercer verano se alimenta de un cadáver de Ánade Azulón el 5.VIII (G. Martín García).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave de primer invierno el 26.XI y otra el 2.XII (G. Martín García).



Gaviota Patiamarilla (*Larus cachinnans*) en las graveras de El Porcal el 9 de noviembre (foto: D. González).

- Madrid, río Manzanares, 1 ad. el 6.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r. Una pareja se ha reproducido varios años en una gravera de Velilla de San Antonio. En el resto de la provincia A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje estival el 4.V (D. González).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 3 ej. el 12.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 3 ad. en plumaje de verano sobrevuelan repetidamente el embalse el 17.V y 4 ad. en plumaje de invierno sobrevuelan el embalse el 4.X (J. Ruiz); 2 ad. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- El Escorial, embalse de Valmayor, junto al puente, 32-34 ad. en plumaje de verano sobrevuelan el embalse el 21.V (J. Ruiz).

- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 jov. se alimenta en la laguna del observatorio el 5.VIII y 2 aves (1 jov. y 1 ad.) en el mismo lugar el 18.VIII (G. Martín García).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, vega del río Tajo en Villamejor, 6 m. y 3 h. en cultivos de regadío el 16.II (J. Pinilla/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 111 (VK32).

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora, les.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, Valdepastores (cuadrícula 115, VK31), bando de unos 50 ej. entre un bando de unos 350 sisones se levantan de un erial el 23.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Titulcia, vega del río Tajuña, 1 ej. el 1.II (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 99 (VK54).

- Rivas-Vaciamadrid, cortados del río Jarama, 2 ej. el 8.II (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Aranjuez, El Embocador, unos 2.000 ej. pasados sobre un barbecho de maíz el 29.I (J. Cano).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor, lco. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas, excepto aquellas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Beceril de la Sierra, El Berrocal, 1 pp. posada en un cable el 12.VIII (G. Martín García). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 28 (VL10).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, puente de Villarrubia sobre el río Tajo, primeros ej. el 18.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares: El Encín, 2 ej. el 23.IV (J. J. Díaz y J. Prieto); La Alvega, 3 ind. el 25.IV (COAMB); El Encín, 1 ej. el 3 y 4.X (J. J. Díaz).

- Arganda del Rey, lagunas de Las Madres, 8 ej. el 26.IV (J. Ruiz).

- Villa del Prado, encinares del suroeste del municipio, varios ej. arrullan el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, arrulla al menos 1 ej. el 15.VI (SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 64 (VK57).

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola* 48:131).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz *et al.* 1994; Belinchón *et al.* 1999 y observaciones publicadas en el AOM), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de nuevas colonias no conocidas.

- Villaviciosa de Odón, parque forestal El Castillo, se ven grupos de aves en nidos el 9.III (F. J. Ortega Pinilla).

- Madrid, campus de la Universidad Autónoma, 1 ej. vuela sobre la facultad de Ciencias el 23.III (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

- Madrid, Cementerio Británico (junto al parque de San Isidro), varios ind. construyendo nidos el 29.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- Madrid, Valdelatas, varios ej. entran y salen de un nido en un cedro el 16.X (C. Andrés Barrera).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Lorenzo de El Escorial, La Herrería: 1 ave cantando el 15.III (R. Moreno-Opo) y 2 aves el 5.IV (J. J. Gamonal, I. Vega y J. L. Martínez/SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. cantando en el bosque de ribera el 6.IV; en la misma zona un pollo volandero reclama en una rama despejada y es alimentado por un Carricero Común el 26.VII (J. Liarte). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

- Alcalá de Henares, La Alvega: 1 m. visto cantando el 7.IV (J. J. Díaz); 1 ej. el 8.IV (COAMB).

- Aranjuez, El Embocador, primera cita, 1 ej. el 8.IV (J. Cano).
- San Fernando de Henares, 1 ind. oído el 8.IV (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

Críalo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, primeros ej. observados el 12.III (J. Cano).
- Villa del Prado, encinares del suroeste del municipio, 2 ej. chillan y son perseguidos por urracas el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).
- El Vellón, Carrascal, 1 jov. calicorto el 14.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 23 (VL51).
- San Agustín de Guadalix, dehesa próxima a la población, 1 ej. el 28.VII (I. Sevilla).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor, les.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, 1 ind. el 14.III (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).
- Bustarviejo, primeras escuchas de aves cantando el 20.III (D. Díaz Díaz).
- Alcalá de Henares, La Oruga, 1 ej. oído el 23.III (J. J. Díaz y N. Millán).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: les, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Torrejón de Velasco, camino de las Salinas, 1 h. jov. el 11.XI (P. Orejas y R. Alonso/Brinzal).

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Buitrago del Lozoya, casco urbano, 1 ind. vuela cerca de una farola el 9.X (I. Sevilla).

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdilecha, primera cita del año, 1 ind. cantando el 21.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 ej. el 27.IV (J. J. Gamonal, J. A. López Septiem y F. Martínez Olivas).
- Alcalá de Henares, cantera del Gurugú, nido ocupado con 2 huevos el 21.V (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 66 (VK77).
- Colmenarejo, 1 ave capturada para anillamiento el 25.IX (R. Alonso/Brinzal).

Citas anteriores a 2003

- Alcalá de Henares, casa de oficinas, nido ocupado con 2 huevos el 1.VII.1998 (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 65 (VK67).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta espe-

cie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada con respecto a la del Vencejo Común.

- Madrid, casco urbano: primera cita de varios ej. observados el 28.II, lo que supone la cita más temprana desde 1978 en la zona, y los últimos el 30.VIII (J. Cano); colonia del paseo Dr. Vallejo Nájera (glorieta de Santa María de la Cabeza), unos 25 ind. el 19.III (M. Juan/SEO-Monticola); Carabanchel Bajo, 3 ind. en migración hacia el sur el 24.IX (F. J. Ortega Pinilla).

- Alcalá de Henares, casco urbano: 5 ej. el 9.III, 3 el 15.III (J. J. Díaz); primera cita numerosa el 20.IV (J. Prieto); 2 ej. el 2.X y 1 el 6.X (J. J. Díaz).

- Alcorcón, San José de Valderas, primera cita anual, 50 ind. el 23.III (F. J. Ortega Pinilla).

- Colmenar Viejo, casco urbano, primera cita anual, 1 ind. el 8.IV (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).

- Madrid, Carabanchel, observaciones del mes de julio: bandos grandes y ruidosos se observan la semana del 7-11; el tamaño de los bandos se reduce, aproximadamente, en un 70-80% la semana del 14-18; la práctica totalidad de los ind. han abandonado la zona la semana del 21-25 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), véase "Criterio" en el Vencejo Común.

- Alcalá de Henares, casco urbano, 10 ej. el 3.IV (J. J. Díaz).

- Madrid, Usera, 1 ind. con un fuerte traumatismo el 7.VI, y 1 pollo cae del nido el 1.VII (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinza). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 76 (VK46).

Citas anteriores a 2003

- Parla: se localiza una colonia de 4-6 pp. ubicada en dos edificios contiguos de la calle Real en junio de 2001; zona de la calle Reina Victoria y avenida Juan Carlos I, se observan 3-4 ind.; calle Getafe, se observa 1 ind. entrar bajo la teja de un edificio en 2002 (M. Gómez

Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 88 (VK35).

- Fuenlabrada, La Serna, 3 aves en vuelo el 25.III.2002 (B. Molina/SEO-Monticola).

Vencejo Real (*Tachymarpis melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar Viejo, ermita de los Remedios, 1 ind. junto a vencejos comunes el 25.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Alvega, nido ocupado el 4.VII (J. Prieto y F. J. Pastor). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 53 (VK68).

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Daganzo de Arriba, cita temprana, 1 ej. el 2.IV (C. Andrés Barrera).

- Colmenar Viejo, Cerro Marmota, 2 ej. el 4.IV (C. Andrés Barrera).

- San Agustín de Guadalix, 1 ej. el 5.IV (C. Andrés Barrera).

- Camarma de Esteruelas, un pequeño grupo en vuelo sobre el arroyo Camarmilla el 6.IV (J. Liarte).

- Madrid, primera cita, varios ej. el 7.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares: parque de los Cerros, varios oídos el 8.IV (COAMB); cerro Colorado, 150 ej. en paso el 8.IX (COAMB); El Encín, última cita, 1 ej. el 19.IX (J. J. Díaz).

- Santorcaz, presente en la localidad desde el 14.IV hasta el 7.IX (A. Doncel).

- Soto del Real, embalse de Santillana, paso en dirección noroeste, se contabilizan 102 aves en una hora, volando a media altura, el 3.IX (G. Martín García).

- Colmenar de Oreja, sotos del río Tajo, últimos ej. el 8.IX (J. Cano).

Carraca (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (Díaz *et al.* 1994).

- Villacanejas, 1 ej. cazando el 20.IV (R. Moreno-Opo).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 27.IV (J. Hernández).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 18.VII (J. J. Díaz).
- Soto del Real, embalse de Santillana, 1 ave sobrevuela la laguna del observatorio el 29.VII (G. Martín García).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, 1 ej. el 10.II (Ó. Cabello). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 53 (VK68).
- San Fernando de Henares, soto de Aldovea, 2 ind. el 2.XII (J. C. Rincón). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 64 (VK57).

Torcecuello Euroasiático (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, Ira, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, se anilla 1 ind. el 19.I y el 9.XI se recaptura 1 ej. anillado el 19.IX (SEO-Monticola).
- San Lorenzo de El Escorial, captura de 1 ave para su anillamiento el 28.II (GEAC).
- Alcalá de Henares, 1 ej. oído el 28.III (J. J. Díaz y Ó. Cabello).
- Aranjuez, El Embocador, primera observación, 1 ej. el 8.IV (J. Cano).
- Bustarviejo, 2 m. cantando en distintos puntos el 1.V (D. Díaz Díaz).
- Los Santos de la Humosa, bosque de ribera del río Henares, 1 m. canta en la rama de un árbol seco, llega la hembra y copulan, para seguidamente alejarse los dos el 11.V (J. Liarte).
- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ej. en una zona de olivos el 4.X (D. González).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, se captura 1 jov. el 28.VI (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, 1 pp. capturada para anillamiento, la h. con placa de incubación desarrollada, el 15.VI (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 52 (VK58).
- Daganzo de Arriba, río Torote, 2 ind. el 29.XI, el 13.XII y el 28.XII (F. Ávila). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 43 (VK69).

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: s en número muy pequeño.

Criterio: todas las citas recibidas, para la zona de La Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial) sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 h. ad. picotea ramas secas de un chopo el 2.III (J. Ruiz).
- Villanueva del Pardillo, río Aulencia, unos 200 m aguas arriba del cruce con la M-503, 1 h. ad. picotea en un chopo el 4.V (J. Ruiz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 48 (VK18).
- Manzanares El Real, área recreativa La Chopera, 3 jov. el 17.VI (S. Sanz y A. H. Ortega Morejón). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 29 (VL20).
- Manzanares El Real, arroyo Samburiel, 1 m. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Calandria (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.



Pico Menor (*Dendrocopos minor*) capturado para anillamiento en La Herrería (San Lorenzo de El Escorial) el 31 de agosto (foto: J. A. Casado).

- Camarma de Esteruelas, Valdehornos, 1 ej. el 8.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 43 (VK69).

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ave el 26.III (G. Martín García).
- Algete, Llano del Campo, se escucha al menos 1 ej. el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Terrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, un bando de 30-35 ej. se alimenta en una zona pedregosa de la orilla del embalse el 10.XII (G. Martín García). Sería la segunda cita para Madrid, además en el mismo lugar y fechas que la de 1998.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, campos de cultivo junto al arroyo de Arroafresno, 1 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-

Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, encinares del sudoeste del municipio, 2 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).
- Camarma de Esteruelas, Torobisco, 1 m. cantando el 8.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 53 (VK68).

Totovía (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, pinares sobre los cortados del río Manzanares, canta 1 m. el 8.II y se observa 1 ej. el 20.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).
- San Martín de la Vega, pinares de Gózzquez de Arriba, cantan varios m. el 15.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 89 (VK45).
- Villa del Prado, encinares del sudoeste del municipio,

cantan varios m. el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, últimos ej. invernantes el 26.III y primeros el 22.X (J. Cano).

- Getafe, base aérea, 1-4 pp. criando por primera vez en los últimos 9 años de observaciones; sin embargo, el 17.V se procede a la siega de algo más de 20 ha de pastizal donde se ubican (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 75 (VK36).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. sobre-vuela el embalse el 2.III (J. Ruiz).

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 10 ej. el 21.III (J. Hernández).

- Madrid, El Pardo, se localizan al menos dos colonias en el embalse, de 20-30 nidos y de 18 (G. Martín García y M. M. Araujo).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso otoñal de 2 jov. el 7.X (SEO-Monticola).

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S. les.

Criterio: sólo citas de interés.

- Navacerrada, embalse, los primeros ej. de la colonia de la presa se observan el 26.III (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 2 ind. junto con un Avión Común el 16.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Alcalá de Henares: parque de los Cerros, 1 ej. el 11.II (J. Prieto); casco urbano, 1 ej. el 26.II (C. Cuesta) y el

27.II (COAMB); primer día en que la especie es abundante el 4.III (J. Prieto y J. J. Díaz); parque de los Cerros, paso de centenares de aves en dirección sur el día 3.X (COAMB); El Encín, 10 ej. el 17.X (J. J. Díaz).

- Pelayos de la Presa, casco urbano, 1 ind. el 18.II (I. Sevilla).

- Madrid, casco urbano: primeros ej. el 25.II (J. Cano); Carabanchel, 1 ej. vuela hacia el sur al atardecer el 25.X (J. Pinilla/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, varios ind. el 26.II (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 ind. el 27.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola y C. Álvarez Usategui).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera observación, varias aves el 1.III (G. Martín García).

- Estremera, al menos 4 ej. vuelan por el casco urbano el 1.III (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

- Buitrago del Lozoya, Las Gariñas, 2 ind. el 6.III (Ó. Martín Díaz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, unas 200 aves en migración el 16.III (G. Martín García y D. González Fernández).

- Villa del Prado, varios ej. entran y salen de diferentes establos el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

- Camarma de Esteruelas, grupo de unos 20 ej. en vuelo junto al arroyo Camarmilla el 11.X (J. Liarte).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. el 15.X (COAMB).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, última cita del año, 2 ind. el 27.X (M. Juan/SEO-Monticola).

- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, más de 10 ad. alimentándose en el carrizal el 1.XI (J. Ruiz).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Santorcaz, 1-2 pp. que crían desde el 16.V hasta el 15.IX (A. Doncel). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 55 (VK88).

- El Vellón, Carrascal, 1 pp. con comportamiento territorial el 14.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 23 (VL51).

- Los Santos de la Humosa, piscina, 1 pp. el 26.VII (J.

Prieto). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

- Valdeterres de Jarama, arroyo Valtorón, última cita postnupcial, 3 ej. volando en dirección sureste el 19.X (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 21 ind. llegan a la laguna a primera hora el 22.X (R. Ramos y E. Navarro).
- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, 6-8 ad. alimentándose en el carrizal el 1.XI (J. Ruiz).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- San Fernando de Henares, varios ind. el 26.II (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares: campus universitario, 1 ej. el 27.II (P. Calzada); casco urbano, 1 ej. el 1.III (J. Prieto); parque de los Cerros, fuerte paso migratorio el 3.X (COAMB); casco urbano, última cita, 2 ind. el 6.X (J. Prieto).
- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera cita anual, 3 ind. el 27.II (C. Sanz, J. A. Sanz, T. Perdiguero y J. Castro).
- Madrid, casco urbano: primeros ej. el 28.II y últimos el 3.X (J. Cano); calle Malmoe (Las Rosas), 7 ind. usan como dormitorio las ramas de un plátano de mediano porte el 17.IX y el 19.IX (M. Juan/SEO-Monticola).
- Titulcia, puente de hierro sobre el río Jarama, más de 50 ej. alimentándose en el carrizal el 1.XI (J. Ruiz).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, última cita postnupcial, 1 ind. junto con 2 aviones roqueros el 16.XI (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Citas anteriores a 2003

- Madrid, Carabanchel Bajo, calle General Ricardos, 1 ave volando alto hacia el sur el 2.XII.2002 (F. J. Ortega Pinilla).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Campo Real, primera cita primaveral, 1 ind. el 5.IV (M. Juan y G. González Fernández/SEO-Monticola).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 ej. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, 2 ej. en El Encín el 31.III y 1 ej. en La Alvega el 25.IX (J. Prieto).
- Madrid, Carabanchel, 1 ej. vuela hacia el sur al atardecer el 7.X (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: lab, P.

Criterio: fechas extremas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, fuerte sedimentación de aves en paso, se localizan al menos 3 bandos de 70-100 aves cada uno el 26.III (G. Martín García).
- Alcalá de Henares, última cita, 1 ej. el 8.IV (J. Prieto).
- Colmenar de Oreja, última observación como invernante el 12.IV y primera el 7.X (J. Cano).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera llegada otoñal, unos 15 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Camarma de Esteruelas, 2 ej. en un retamar de ladera el 7.X (J. Liarte).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, primera cita postnupcial, 1 ind. el 19.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, primera captura invernal de 3 ej. el 2.XI (GEAC).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, primera observación del año, 1 m. el 24.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- Soto del Real, embalse de Santillana: primera observación, 2 aves entre bisbitas comunes el 26.III (G. Martín García); primeros ej. de la subsp. *flava*, 3 m. y 1 h. el 7.IV (G. Martín García).

- San Fernando de Henares, 1 m. de la subsp. *flavissima* el 15.IV (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: primeros ej. en paso postnupcial de la subsp. *iberiae*, 2 ad. el 27.VIII (G. Martín García); primeros ej. no correspondientes a la subsp. *iberiae*, 1 ad. de la subsp. *flavissima* y otro de la subsp. *flava* entre un grupo de unas 20 aves el 8.IX (G. Martín García).
- Los Santos de la Humosa, río Henares, 8 ej. el 26.IX de la subsp. *flavissima* (COAMB).
- Valdetorres de Jarama, arroyo Valtorón, última cita del año, 2 ej. el 28.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, parque lineal del río Manzanares, 1 ad. y 1 jov. el 30.VI (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 76 (VK46).

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Manzanares El Real, desembocadura del arroyo de Samburiel en el embalse de Santillana: 1 m. de la subsp. *yarrellii* el 28.II (D. Díaz Díaz); y 1 m. y 1 h. de la subsp. *yarrellii* el 1.III y el 2.III (G. Martín García, M. Rodero, M. M. Araujo y V. Merino).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochín (*Tragodytes tragodytes*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en invernada el 17.III (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada el 22.III y primeras el 11.X (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada el 29.III (SEO-Monticola).

- Daganzo de Arriba, río Torote, varios ind. cantando el 10.V (F. Ávila). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 43 (VK69).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas fuera de la sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 9.II y primera captura en paso otoñal o invernada el 1.XI (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada el 10.III (SEO-Monticola).
- Santa María de la Alameda, arroyo del Hornillo, 1 ad. ceba 1 pollo volandero el 5.VII (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 36 (UK99).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Cercedilla, pista del puerto de Navacerrada a la Bola del Mundo, 12 ej. alimentándose el 11.I (J. Seoane).
- Bustarviejo, Mondalindo, 2 aves en los roquedos el 19.III (D. Díaz Díaz).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura primaveral el 24.III y captura tardía de 1 ave el 3.V (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las

Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 29.III, primera captura en paso otoñal el 26.IX (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, 1 ej. el 14.V y el 31.VIII (J. A. López Septiem/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de La Presa del Rey, última captura primaveral el 10.IV (SEO-Monticola).

- Fuenlabrada, 1 ej. observado en la misma fecha que el año anterior en los jardines de un colegio el 26.V (B. Molina/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2003

- Fuenlabrada, 1 ave en los jardines de un colegio el 26.V.2002 (B. Molina/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 88 (VK35).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, parque lineal del río Manzanares, primera observación el 2.IV (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de La Presa del Rey, primera captura el 5.IV y primeros jov. el 14.VI (SEO-Monticola).

- Cobeña, arroyo de las Quemadas, cantan 2 m. el 6.IV y se observa 1 ej. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

- Alcalá de Henares: El Val, 1 m. oído el 6.IV (J. Prieto); río Henares, 4 m. oídos el 8.IV (J. Prieto y J. J. Díaz); última cita el 10.IX (J. Prieto).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 2 aves el 12.IV (J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral el 12.IV, primer jov. el 21.VI y última captura el 23.IX (SEO-Monticola).

- Bustarviejo, casco urbano, 1 ind. cantando el 17.IV (Ó. Martín Díaz).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primera captura primaveral el 17.IV y primer jov. el 15.VI (SEO-Monticola).

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, les, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura en invernada o paso prenupcial con 4 ej. el 15.III; se capturan 4 aves en diciembre, 4 en enero y 6 en febrero (GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 16.III y primera captura en paso otoñal el 1.IX; se capturan 1 ave en enero, 2 en febrero y ninguna en diciembre (SEO-Monticola).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, última observación como invernante el 18.III y primera el 4.XI (J. Cano).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares: 1 m. el 28.III (J. Prieto); río Torote, 1 m. el 10.IV (COAMB).

- Villarejo de Salvanés, Encomienda Mayor de Castilla, 1 m. de segundo año es capturado para anillamiento el 15.V (SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, 2 ind. en una zona quemada del monte el 3.IX (C. Andrés Barrera).

- Torres de la Alameda, 1 ej. el 4.IX (J. Herrera).

- Camarma de Esteruelas, 1 m. en chopera del arroyo Camarmilla el 7.X (J. Liarte).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso otoñal el 4.X (SEO-Monticola).

- Leganés, parque de Polvoranca, se anillan 2 aves el 17.X (G. González/SEO-Monticola).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e muy escasa en la sierra, lac, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Meco, 2 ej. en una retama entre campos de cereal el 13.IV, y en la misma zona 1 m. y 1 h. en diferentes campos el 30.VIII (J. Liarte).

- Alcalá de Henares, La Alvega, 1 ej. el 25.IV (J. Prieto).

- Bustarviejo, la Fresneda, 1 m. el 4.V. (D. Díaz Díaz).
- Rascafría, primera llegada, 1 m. el 13.V (M. Juan y J. de la Puente/ SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso otoñal el 24.VIII y última el 9.X (SEO-Monticola).
- Villalbilla, cerro del Viso, 2 ej. el 4.IX (COAMB).
- Boadilla del Monte, 2-3 ej. el 6.IX (C. Andrés Barrera).
- Camarma de Esteruelas, 1 m. en chopera junto al arroyo Camarmilla el 7.X (J. Liarte).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: citas de interés.

- Daganzo de Arriba: cerca del río Torote, 1 ej. el 8.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola); río Torote, primera cita postnupcial, el 15.X (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 43 (VK69).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Molinos, camino de la Solana, primera cita del año, 1 m. el 11.III (C. Pontegnie).
- Algete, Llano del Campo, 1 pp. el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Soto del Real, arroyo Chozas, primera observación, 1 pp. ocupa territorio el 7.IV (G. Martín García).
- Santa María de la Alameda, puerto de Malagón, varios ad. ceban pollos voladeros el 5.VII (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 37 (VK09).
- Getafe, últimos ej. observados en migración el 20.IX (J. Cano).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, última cita con unos 5 ind. el 5.X (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).
- Meco, 1 ej. en rastrojos de campos de cereal el 11.X (J. Liarte).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 m. el 28.III (Ó. Cabello y J. J. Díaz).
- Algete, Llano del Campo, 1 h. el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Soto del Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ave el 7.IV (G. Martín García).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Chinchón, cortados cercanos a laguna de San Juan, 1 m. el 20.X (R. Ramos y E. Navarro).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: Ira, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, Iab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Miraflores de la Sierra, casco urbano, 1 m. parcialmente albino — presenta cabeza, cuello y pecho totalmente blancos, el obispillo blanco con algunas plumas negras, mientras que las alas y la cola son negras — el 13.III y el 15.IV (D. Díaz Díaz).
- Madrid, complejo deportivo de Vallehermoso, se escucha el primer canto del año al atardecer del 11.II (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: observaciones en cuadrículas con invernada no confirmada y fechas extremas.

- Camarma de Esteruelas, arroyo Camarmilla, 1 ej. posado en un chopo el 11.I (J. Liarte). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 43 (VK69).

- Algete, 5-6 ind. el 2.III (J. Ortas).

- Robregordo, dehesa Boyal, 2 ind. el 4.III (Ó. Martín Díaz).

- Valdemora, Parque Regional del Sureste, al menos 2 ej. el 17.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la sierra, lab, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada el 29.III y primeras el 11.X (SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, última observación como invernante el 2.IV y primera el 22.X (J. Cano).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura primaveral el 10.IV (SEO-Monticola).

- Bustarviejo, la Fresneda, 1 m. cantando el 20.V (D. Díaz Díaz). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 15 (VL42).

- Camarma de Esteruelas, varias aves en una chopera junto al arroyo Camarmilla el 11.X (J. Liarte).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Robledo de Chavela, captura de 1 ave para su anillamiento el 23.X (GEAC).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Villa del Prado, encinares del suroeste del municipio, 1 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 83 (UK85).

- San Martín de la Vega, pinares de Gótzquez de Arriba, 1 ave el 31.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (VK55).

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, arroyo de Arroforesno, al menos 2 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 83 (UK85).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeros jov. capturados el 11.VI (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 22.VI (SEO-Monticola).

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

- Villa del Prado, arroyo de Arroforesno, 1 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, se captura 1 ej. el 10.IV (SEO-Monticola).

- Santa María de la Alameda, captura de 1 ave para su anillamiento el 7.VIII, el 14.VIII, el 5.IX y el 6.IX (GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en migración otoñal el 16.VIII, máximo de paso con 5 capturas el 17.IX y último el 12.X, con un total de 41 capturas entre esas fechas (SEO-Monticola).

- Zarzalejo, captura de 1 ave para su anillamiento el 21.VIII (GEAC).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2003

- San Martín de la Vega, Los Albardales, 1 ej. es observado en una pradera encharcada con vegetación palustre de baja altura el 19.VIII.2002 (S. Solís y R. Moreno-Opo).

Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración. Para información detallada acerca del paso migratorio de la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y De la Puente (2002).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 29.III, se capturan sólo 5 aves en todo el paso prenupcial, la última con 1 ind. el 21.V, primera captura en paso postnupcial con 2 aves el 12.VII, máximo con 3 aves el 17.VIII, y última captura con 1 ave el 13.X (SEO-Monticola).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. se mueve por la parte baja de un taray del bosque de ribera del río Henares el 27.IV (J. Liarte).

- Santorcaz, 5 ind. el 31.VIII (A. Doncel).

- Aranjuez, Mar de Ontigola, 1 ind. el 22.X (R. Ramos y E. Navarro).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones pueden ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, río Henares, 1 ej. el 5.IV (J. Prieto).

- Colmenar de Oreja, soto de Oreja, primer ej. observado el 8.IV (J. Cano).

- Alcalá de Henares, río Henares, varios ej. el 8.IV (COAMB).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura el 14.IV, primer jov. el 6.VII, pico de paso postnupcial el 18.VIII con 50 aves y última captura de 3 ind. el 1.XI (SEO-Monticola).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura invernal, 1 jov. el 9.XI (GEAC).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, 1 ind. cantando el 8.IV (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave el 22.IV, primer jov. el 28.VII y última captura de 1 ind. el 17.IX (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, 1 ej. capturado para anillamiento el 27.IX (J. J. Gamonal, I. Vega y E. Escudero/SEO-Monticola).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo *et al.* (2002).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Lorenzo de El Escorial, primera captura de 1 ave para su anillamiento en paso prenupcial el 17.IV (GEAC).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 24.IV (COAMB).

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. anillado en el arroyo Meaques el 25.IV (J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Madrid, primeros ej. en paso prenupcial el 25.IV; últimos ej. en paso postnupcial el 18.IX (J. Cano).
- Madrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 10.V, primer jov. el 20.VII (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 5.V, primer jov. el 5.VII (SEO-Monticola).
- Villa del Prado, arroyo de Arrofrasco, 1 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 83 (UK85).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 2 ej. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso postnupcial el 15.IX (SEO-Monticola).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, finca La Boyeriza, 1 m. canta el 31.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 90 (VK55).

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, varios ej. el 10.III (J. J. Díaz).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Camarma de Esteruelas, 1 m. en un retamar de ladera cerca del arroyo Camarmilla el 19.III (J. Liarte).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 m. el 25.III (C. Cuesta, F. J. Pastor y J. J. Díaz).
- Daganzo de Arriba, cerca del río Torote, 1 pp. con comportamiento territorial el 8.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 43 (VK69).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 m. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Gózquez de Arriba, 1 ej. el 15.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 89 (VK45).

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Los Santos de la Humosa, 2 m. cantando el 28.IV (COAMB).
- Villarejo de Salvanes, Encuenda Mayor de Castilla, 1 m. de segundo año es capturado para anillamiento el 15.V (SEO-Monticola).
- Boadilla del Monte, río Guadarrama, captura de 1 m. ad. para anillamiento el 9.IX (C. Ponce y J. A. Calleja/SEO-Monticola).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. el 10.IV (E. Estalrich).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 17.IV (J. J. Díaz).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso postnupcial el 3.VIII, máximo de paso el 17.VIII y última captura 29.IX (SEO-Monticola).
- Bustarviejo, camino del Bustar, 1 ind. el 20.IV (J. C. Atienza y G. P. Farinós/GEAC).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- Alcalá de Henares, La Alvega, 1 ej. el 9.IV (J. J. Díaz).
- Pozuelo de Alarcón, arroyo Meaques, 2 aves anilladas el 21.IV (J. Yáñez/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial el 26.IV y última el 10.V (SEO-Monticola).
- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer anillamiento en paso prenupcial el 26.IV y último el 10.V (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial el 21.V, primer anillamiento en paso postnupcial el 21.VIII y última captura 22.IX (SEO-Monticola).
- Olmeda de las Fuentes, primera captura para anillamiento el 13.VIII (J. Gamonal/SEO-Monticola).
- Valdeaguna, El Bosque, 8 aves capturadas para anillamiento el 4.X (J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Fresnedillas de la Oliva, Angosturas, última captura de 1 ave para su anillamiento el 18.X (GEAC).

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, últimas capturas en paso prenupcial con 3 aves el 14.IV, primeras en paso postnupcial el 11.IX y pico de paso con 8 aves el 6.X (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fuente el Saz de Jarama, arroyo de los Muertos, 1 ave capturada para su anillamiento el 23.III (GEAC).
- Madrid, parque lineal del río Manzanares, primera observación el 1.IV (J. Cano).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 m. cantando en migración el 6.IV (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, varias aves el 13.IV (J. J. Gamonal y J. L. Martínez/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura tardía de 1 jov. el 22.IX (SEO-Monticola).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se

encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, Ico, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés. A partir de este Anuario se intentará separar las observaciones de Mosquitero Común e Ibérico, aunque es posible que algunas observaciones de Mosquitero Ibérico se asignen por error a Mosquitero Común.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, última captura en paso prenupcial el 24.III (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en paso prenupcial el 10.IV (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 22.IV, primera en paso otoñal el 12.IX y pico de este paso con 23 capturas el 29.XI (SEO-Monticola).
- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 ej. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).
- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, pico del paso postnupcial con 38 aves el 26.X (GEAC).

Mosquitero Ibérico (*Phylloscopus ibericus*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Santa María de la Alameda, captura de 1 ej. para su anillamiento el 5.IX (GEAC).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial 15.III (GEAC).
- Fuente el Saz de Jarama, arroyo de los Muertos, primera captura de 1 ave para su anillamiento en paso prenupcial 16.III (GEAC).
- Aranjuez, azud de El Embocador, 1 ej. el 8.IV (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 10.VIII, máximo de paso el 23.VII con 13 capturas y última el 13.X (SEO-Monticola).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas de interés.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapilla*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, última captura en invernada el 1.III (SEO-Monticola).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Alvega: 1 ej. el 22.IV y varios ej. el 7.V (J. J. Díaz y J. Prieto); observado el 26.IX (COAMB).

- Los Santos de la Humosa, 1 ej. en el bosque de ribera del río Henares el 27.IV (J. Liarte).

- Bustarviejo, la Fresneda, al menos 3-4 ind. el 4.V (D. Díaz Díaz).

- Madrid, primera observación en paso prenupcial el 7.V (J. Cano).

- Santorcaz, 1 ind. el 8.VI y comienzo del paso de otoño el 15.VII (A. Doncel).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial el 27.VIII y última el 1.X (SEO-Monticola).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ind. el 30.VIII (F. Ávila).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Campo de las Naciones, observación invernada de 1 ave solitaria el 15.I, el 18.I y el 24.I (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

- Alcalá de Henares: 1 ej. el 8.IV (E. Estalrich); 1 ave el 7.V (J. Prieto); primera cita postnupcial el 12.VIII (P. Prieto); abundante hasta el 3.X y última cita el 14.X (COAMB).

- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 ej. el 10.IV (F. J. Pastor).

- Bustarviejo, la Fresneda, 1 m. el 4.V (D. Díaz Díaz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso postnupcial de 2 ind. el 16.VIII, pico de paso el 28.IX con 7 aves y última captura con 2 ind. el 5.X (SEO-Monticola).

- Madrid, primeros ej. en paso postnupcial el 17.VIII y últimos el 14.X (J. Cano).

- Becerril de la Sierra, primera observación postnupcial, 1 jov. el 18.VIII (G. Martín García).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso postnupcial de 5 ind. el 23.VIII (SEO-Monticola).

- Camarma de Esteruelas, 1 ej. en una chopera del arroyo Camarmilla el 11.X (J. Liarte).

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, 7 aves en los jardines de Aranjuez el 12.X.2002 (B. Molina/SEO-Monticola).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, carrizal del Mar de Ontígola, 1 m. y 1 h. el 23.III.2002 (J. L. Fuentes Serrano/Naumanni).

- San Martín de la Vega, Los Albarrales, 1 ej. se detecta reclamando y después se observa en el carrizal al atardecer el 24.XI.2002 (R. Moreno-Opo y J. Gamonal/SEO-Monticola).

Mito (*Aegithalus caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 29.V (SEO-Monticola).

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Nuevo Baztán, varios m. cantando el 9.V (COAMB). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 67 (VK87).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, nido ocupado el 14.V (J. Herrera y C. Cuesta). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 54 (VK78).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Carbonero Común (*Parus major*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 29.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 7.VI (SEO-Monticola).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)Estatus provincial: lac.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 10.VI (SEO-Monticola).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)Estatus provincial: S, lco.Criterio: sólo citas de interés.

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 1 ave el 9.III (Ó. Llama y M. González/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Santorcaz, 2-3 ind. el 17.IV y el 16.V, además se observan nidos (A. Doncel). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 55 (VK88).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E. Las observaciones en fechas inusuales (invierno fundamentalmente) de aves detectadas exclusivamente por el canto no se publicarán dada la habitual confusión con imitaciones y emisiones de estorninos negros. Debe considerarse que la llegada de esta especie se suele producir la primera quincena de abril.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ej. el 24.IV (J. Herrera, E. Estalrich, C. Cuesta y Ó. Cabello).
- Rivas-Vaciamadrid, Cristo de Rivas, río Jarama, 4 ej. el 26.IV (J. Ruiz).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 2 aves el 27.IV (J. J. Gamonal, J. A. López Septiem y F. Martínez Olivás).
- Los Santos de la Humosa, 1 m. en el bosque de ribera del río Henares, el 27.IV (J. Liarte).
- Colmenar de Oreja, río Tajo, primer ej. observado el 1.V (J. Cano).
- Villa del Prado, encinares del suroeste del municipio, al menos 1 m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e reproductor escaso en la sierra, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas en localidades con cría ya confirmada en los últimos años, en cuyo caso sólo se publicarán citas de fechas extremas.

- Los Molinos, camino de la Solana, 1 m. el 22.V (C. Pontegnie).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, cordel de la Senda Galiana, primera cita del año, 1 ad. el 13.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, primeros ej. el 15.IV (J. Cano).
- San Fernando de Henares, 1 ind. el 15.IV (J. A. López Septiem/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 17.IV (J. J. Díaz).
- Bustarviejo, El Valle, primera cita del año, 1 ej. el 24.IV (D. Díaz Díaz).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Chova Piquirroja (*Pyrhacorax pyrrhacorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 14 ej. en las ruinas árabes el 17.II (COAMB).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

Sin citas de interés.

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Sin citas de interés.

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, cortados del río Jarama, 1 pp. el 8.II (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).
- Alcalá de Henares, parque de los Cerros, 1 ej. el 8.IV y el 29.IV (COAMB).
- Daganzo de Arriba, río Torote, 1 pp. el 10.IV y el 5.IX (COAMB). La especie está extinguida en la cuadrícula 54 (VK78) ya que la única pareja nidificante desapareció hacia 1997.
- El Vellón, Carrascal, 1 ad. con ceba el 14.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 23 (VL51).

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Alcalá de Henares, casco urbano, dormideros sobre grandes pinos carrascos, se comprueba el uso simultáneo de al menos 3 dormideros, estimándose un mínimo de 1.500 ej. el 13.XII (J. Prieto).

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrión Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: s, lco. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- Fresno de Torote, 50 ej. el 5.IX (COAMB).

- Daganzo de Arriba, río Torote, grupo de unos 20 ind. el 13.XII (F. Ávila). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 43 (VK69).
- Leganés, parque de Polvoranca, se anillan 2 aves el 16.I (G. González/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, capturas estivales, 1 m. el 3.VI y 1 h. y 2 m. el 5.VII, las aves presentaban placa incubatriz o protuberancia cloacal desarrollada (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (VK56).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 22.III, captura estivales, 1 h. y 1 jov. el 1.VI y 1 h. con placa incubatriz el 6.VII (SEO-Monticola).

Gorrion Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 10.VI (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

Gorrion Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Ajalvir, arroyo de las Huelgas, grupo de unos 10 ind. el 29.VI (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 53 (VK68).

Gorrion Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengali Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones silvestres escapadas de cautividad.

Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000).

- Aranjuez, vega del río Tajo, 4 ej. el 12.I y 12 ej. el 18.I

(J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 104 (VK43).

- Aranjuez, Casa Carmena, 8 ej. el 19.I (J. Pinilla/SEO-Monticola).
- Aranjuez-Aceca, 2 ej. en el río Tajo el 11.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, soto de las Juntas, 11 ind. el 8.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 13 ej. el 4.V (J. Marchamalo, J. A. López Septiem, J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, 4 m. construyendo nidos junto a un carrizal el 10.IX (J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2003

- Aranjuez, 35 ej. en cultivos junto al río Tajo a varios kilómetros de los prados de las Infantas el 12.I.2002 (B. Molina y E. Escudero/SEO-Monticola).

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, encinares del suroeste del municipio, varios m. cantando el 17.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 83 (UK85).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Valdemaqueda, límite provincial, 1 m. asociado a un bando de fringílidos el 5.XI (F. Martín Martín/SEO-Monticola).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeras capturas de jov. el 24.V (SEO-Monticola).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y citas de interés.

Sin citas de interés.

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 7.VI (SEO-Monticola).

- Madrid, Estación de Anillamiento de Barajas, primer jov. capturado el 15.VI (SEO-Monticola).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 24.V (SEO-Monticola).

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, parque de Entrevías, 5 ej. el 9.III (J. Cano).

- Aranjuez, puente de La Reina sobre el río Tajo, 28 ej. el 12.III (J. Cano).

- Alcalá de Henares: río Henares, 3 ind. el 17.III (COAMB); 4 ej. el 9.IV (J. J. Díaz).

- Cercedilla, 2 m. cantando y 1 h. el 10.V (C. Pontegnie).

- Cercedilla, carretera entre el puerto de Navacerrada y el de Cotos en el límite con La Granja (Segovia), 1 jov. con todo el plumaje sin mudar recién atropellado el 7.V (J. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 18 (VL01).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Gótzquez de Arriba, varios m. cantan el 15.V (J. Pinilla/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 89 (VK45).

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villarejo de Salván, Encomienda Mayor de Castilla, se observan grupos familiares y varios ej. en plumaje juvenil son capturados para anillamiento el 15.V (SEO-Monticola). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 101 (VK74).

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Zarzalejo, capturas para anillamiento, 23 ind. el 25.II y 1 ave el 29.II y el 18.III (GEAC).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. el 26.XI (G. Martín García).

Citas anteriores a 2003

- Manzanares El Real, cerca del embalse de Santillana, 2 h. anilladas el 12.XI.1974 (A. Strubell y E. Mills, comunicado por J. Marchamalo).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, La Alvega: 7-10 ej. comiendo semillas de *Ulmus pumila* el 7.IV (J. J. Díaz); 4 el 8.IV (E. Estalrich); 7 el 9.IV (J. J. Díaz y J. Prieto) y 1 el 26.V (J. Herrera). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 54 (VK78).

- Los Santos de la Humosa, 1 pp. el 3.V (C. Cuesta, N. Millán y J. J. Díaz). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 55 (VK88).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios se restringe el criterio a fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Horcajo de la Sierra, La Navazuela, 2 pp. el 12 y el 13.II (Ó. Martín Díaz). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 5 (VL54).

- Santorcoz, 5-6 ej. el 31.XII (A. Doncel). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 55 (VK88).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Alcalá de Henares, río Henares, 1 pp. el 17.III (J. Herrera y J. J. Díaz).

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la sierra y fechas extremas.

- Olmeda de las Fuentes, 1 ej. el 21.VIII (J. J. Gamonal e I. Vega/SEO-Monticola).

- Cobeña, arroyo de las Quemadas, 1 m. el 14.IX (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, última cita del año, 2 h. el 9.III (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

- Aranjuez, Estación de Anillamiento de Las Infantas, última captura del paso prenupcial o invernada con 10 ej. el 9.III y primera del paso postnupcial o invernada con 43 ej. el 26.X, captura de 1 h. ad. leucística el 2.XI (GEAC).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 22.III, primera captura en paso otoñal el 1.XI y pico de paso postnupcial con 19 capturas el 9.XI (SEO-Monticola).

- Santorcaz, 1 ej. el 14.XII (A. Doncel). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 55 (VK88).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Observaciones procedentes de escapes

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Mandarin (*Aix galericulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de la Rusia, noreste de China y Japón. Con poblaciones asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser sedentarias (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994). Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de

distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Níger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Fernando de Henares, soto de Aldovea, colonia de cigüeñas, 1 ej. reclamando el 18.V (J. Prieto).

- Getafe, base aérea, 1 ej. observado el 11.XII (J. Cano).

Citas anteriores a 2003

- San Martín de la Vega, río Jarama a la altura del carrizal de Las Minas, 1 ej. en vuelo el 22.XII.2002 (B. Molina/SEO-Monticola).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de jaula no está permitido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo Noble (*Diopsittaca nobilis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Cabeciazul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, colegio público Lope de Vega, cerca del parque de San Isidro, 4 ej. se alimentan de los brotes de una acacia el 29.III (J. Pinilla/SEO-Monticola y S. Sotillos).

- Boadilla del Monte, 1 ej. vuela, reclama y se posa en una encina el 28.X (C. Andrés Barrera).

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2003

- Fuentidueña de Tajo, vega del río, 1 ej. el 17.IV.1993 (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perico Multicolor (*Platycercus eximius*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, parque lineal del río Manzanares, 1 ej. visto el 24.VI y otro, tal vez el mismo, en la misma zona el 26.VI (J. Cano).

- Madrid, 1 ej. se alimenta en patios y jardines de viviendas cercanas al parque de San Isidro el 16.VII (J. Pinilla/SEO-Monticola).

Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Con poblaciones reproductoras en las cercanías de la ciudad de Barcelona (Rodríguez y Sales 1999). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrion de Java (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rayado (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Tricolor (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Enmascarado (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino Pinto (*Lonchura punctulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Dominicana (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda de Fuego (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cardenal Copetón (*Paroaria coronata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Eophona personata

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ninfa Gris (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.



BIBLIOGRAFÍA

- Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M. P. y De Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71.
- Bermejo, A. y De la Puente, J. 2002. Stopover characteristics of Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) in central Iberia. *Vogelwarte*, 41: 181-189.
- Bermejo, A.; De la Puente, J. y Pinilla, J. 2002. Fenología, biometría y parámetros demográficos del Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*) en España central. *Ardeola*, 49: 75-86.
- Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2000. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. SEO-Monticola. Madrid.
- Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 48-63.
- De Juana, E. 1998. *Lista de las aves de la península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid
- De Juana, E. y Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología 2002. Observaciones de aves raras en España. *Ardeola*, 49: 141-171.
- De Juana, E. y Lorenzo, J. A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.
- De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1991. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guinea-fowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzaneque, Á. y Sánchez, A. 1994. *Atlas de las aves nidificantes en Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.

- ✍ García y Gans, F. J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En: *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✍ Hagemeyer, W. M. y Blair, M. J. 1997 (ed.). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance*. T & AD Poyser. Londres.
- ✍ Juan, M. 2001. El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*: 24-37.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 42-47.
- ✍ Rodríguez, N. y Sales, S. 1999. Ruiseñor del Japón *Leiothrix lutea*. Noticiero Ornitológico. *Ardeola*, 46: 161.
- ✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.



El dormitorio de Lavandera Blanca (*Motacilla alba*) en la Pza. de Conde Casal (Madrid) • Evolución de la invernada de acuáticas en la CAM • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en el interior peninsular • La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares • Fenología de tres especies de passeriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las Minas (Madrid): el Carricerín Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid • Los dormitorios invernales de Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes de la Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996



Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de Codorniz (*Coturnix coturnix*) en Madrid • Dinámica estacional del dormitorio de Hirundinidos de la Laguna de San Juan (Chinchón, Madrid): Golondrina Común (*Hirundo rustica*) y Avión Zapador (*Riparia riparia*) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (*Circus gallicus*), el Busardo Ratoneo (*Buteo buto*) y el Azor Común (*Accipiter gentilis*) en el suroeste de Madrid • Seguimiento y control de la población de Halcón Común (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid • Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo de colonias de Avión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997



Los Aguiluchos Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en las áreas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población de Tórtola Común (*Streptopelia turtur*) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras: situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid 1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid • El Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento en Madrid. I. Passeriformes • Situación del Águila Imperial (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998. • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999. • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (*Dendrocyops minor*) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998



Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid • El Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial "Soto Mozanaque" (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con avines en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común (*Certhia brachydactyla*) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirflona (*Sylvia hortensis*) en el Monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999

Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sísón Común (*Tetrax tetrax*) en la ZEPA "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares" durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torrecuello (*Jynx torquilla*) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una campaña de la sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (*Turdus merula*) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aggyptius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000



Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El Porrón Pardo (*Aythya nyroca*) en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros *Recurvirostra*, *Charadrius*, *Calidris*, y limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte de Valdelatas (Madrid): un estudio basado en el anillamiento • Migración del Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) en el tramo bajo del río Jarama en 2001 • Datos sobre la Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y el Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el valle del Lozoya y Somosierra • Topónimos y características de los humedales con interés ornitológico del Parque Regional del Sureste de Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del año 2001 en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid) • Población reproductora, estado y propuestas de conservación del Cernícalo Primilla (*Falco naumanni*) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la población reproductora de Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento de nidos de las poblaciones nidificantes de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aggyptius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2001 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Lista Sistemática 2001



Estatos regional y preferencias ambientales de la avifauna madrileña durante el invierno • Aporte de presas en nidos de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en el centro de España • Tamaño de la población reproductora y ubicación de nidos de Paloma Torcaz (*Columba palumbus*) en los jardines y sotos de Aranjuez • La población de Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*) del monte de Valdelatas (Madrid): variaciones estacionales y preferencias de hábitat • Fenología y selección de hábitat de dos especies de mosquiteros (*Phylloscopus trochilus* y *Phylloscopus collybita*) en un parque periurbano de Madrid (monte de Valdelatas) • Fenología del Petirrojo (*Eritacus rubecula*) en el tramo bajo del río Jarama • Censo de la población reproductora y caracterización del hábitat del Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Población reproductora e invernante de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en Madrid. Año 2002 • Seguimiento de la población reproductora de Águila Real (*Aquila chrysaetos*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aggyptius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2002 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Censos invernales de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernadas 2001-2002 y 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Lista Sistemática 2002



Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. II. Géneros *Philomachus*, *Limosa*, *Numenius* y *Tringa* • Migración e invernada del Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y situación actual del Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en la Comunidad de Madrid • Descripción y cuantificación de la comunidad de aves reproductora en los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en el centro de España • Fidelidad a los sitios y fenología en la invernada de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1998-2002) • Censo de Abejero Europeo (*Pernis apivorus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2003 • Censo de ardeidas coloniales arborícolas en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Evolución de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la sierra de la Cabrera de Madrid (1994-2004) • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004 • Caracteres climáticos del año 2003 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2003

