

EXPANSIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL ALCAUDÓN DORSIRROJO (*Lanius collurio*) EN LA COMUNIDAD DE MADRID

José Antonio
LÓPEZ SEPTIEM
Luis CORRALECHE
Carlos DOMÍNGUEZ
Faustino MORENO
Federico ROVIRALTA¹
Trinidad SOTO
Javier TAJUELO
Joaquín TELLO

Sociedad para la
Conservación de los
Vertebrados (SCV)
Apdo. 270
28220 Majadahonda
(Madrid)
[http://es.geocities.com/scv
_conservacion](http://es.geocities.com/scv_conservacion)
scv_conservacion@yahoo.es
⁽¹⁾ Autor para correspondencia:
federovira@hotmail.com

RESUMEN

El Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) ha pasado en 20 años de ser una especie ajena a la avifauna madrileña a encontrarse criando todo a lo largo de la ladera sur de la sierra de Guadarrama. Todavía es una especie escasa en la Comunidad de Madrid y la población reproductora se estima en 50-100 parejas.

INTRODUCCIÓN

El Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) está presente en buena parte del norte de la península Ibérica, ocupando principalmente zonas de carácter eurosiberiano como montañas y estribaciones de los Pirineos y cordillera Cantábrica, Galicia, sistema Ibérico septentrional y extremo oriental del sistema Central (Hernández 2003).

A pesar de que en algunas zonas de su área de distribución tradicional parece estar en regresión, en los últimos años está colonizando nuevas zonas donde hasta hace pocas décadas era completamente desconocido. De esta forma, siguiendo el sistema Ibérico y Central, se ha comprobado su cría en Madrid, Segovia, Guadalajara, Ávila, Teruel y Cuenca, y en Soria ha ampliado su área de distribución ocupando buena parte de la provincia (Hernández 2003). En el presente trabajo revisamos la distribución actual del Alcaudón Dorsirrojo en la Comunidad de Madrid y cómo ha colonizado este nuevo territorio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han recopilado todas las observaciones aparecidas en el *Noticiario Ornitológico* de la revista *Ardeola* (1954-2003), en los *Anuarios Ornitológicos de Madrid* (1996-2002; De la Fuente *et al.* 1997, 1998, 1999, 2003; Bermejo *et al.* 2000, 2001, 2002) y en trabajos específicos sobre esta especie en

el ámbito de la Comunidad de Madrid (Roviralta 2002; SCV datos propios).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hasta hace 20 años el Alcaudón Dorsirrojo era una especie desconocida para la avifauna madrileña y no aparece en los primeros atlas de aves nidificantes (De Viedma 1983; Díaz *et al.* 1994; Hernández 1997). Siguiendo el sistema Central apareció criando muy cerca de Madrid, en la sierra de Malagón (Ávila), a principios de la década de los 90 (Soto-Largo 1990). En Madrid la primera cita se produce en 1987 en el puerto de la Morcuera (Barandica *et al.* 1988), pero hay que esperar hasta mediados de la década de los 90 para conocer el primer intento de cría, que se produce en La Cepeda (Santa María de la Alameda) en 1994 (Sociedad para la Conservación de los Vertebrados datos propios). A partir de ese momento, las observaciones se van repitiendo a lo largo de los años desperdigadas por las faldas madrileñas de la sierra de Guadarrama, registrándose en Madrid citas de cría casi todos los años a partir de 1997 (De la Puente *et al.* 1998, 1999, 2003; Bermejo *et al.* 2000, 2001, 2002).

Hoy en día el Alcaudón Dorsirrojo tiene una población reproductora estable en las faldas sur de la sierra de Guadarrama (Roviralta 2002; Hernández 2003), encontrándose como reproductor seguro en 14 cuadrículas UTM 10x10 km desde Santa María de la Alameda hasta Somosierra entre 1.000 y 1.700 m s.n.m (figura 1).

El hábitat que ocupa son pastizales húmedos, habitualmente con algún pequeño arroyo que permita que el pasto se mantenga verde hasta avanzado el verano, y presencia de arbustos (rosal silvestre, zarzas, piornos y cambronales) para asentar el nido y usarlos como posaderos. Estos prados se encuentran desde las típicas zonas de campiña de la parte baja de los valles, pasando por claros y bordes de bosques y llegando hasta los piornales de la parte alta de la sierra. Aunque todavía no puede considerarse un ave habitual en Madrid, el Alcaudón Dorsirrojo ya es relativamente frecuente en el valle del Lozoya



(Foto: F. Jáñez, J. Alonso y A. Liébana)

PALABRAS CLAVE: colonización, distribución geográfica, expansión poblacional, sierra de Guadarrama.





Figura 1. Distribución del Alcaudón Dorsirrojo en la Comunidad de Madrid.

y Somosierra (De la Puente *et al.* 2003), ocupa un tipo de hábitat que existe a lo largo de toda la sierra y en algunos enclaves especialmente favorables se presenta en densidades altas. Este es el caso del puerto del Cardoso, donde en 2002 un muestreo parcial de las amplias zonas de prados salteados de matorral arrojaron la cifra de unas 6-8 parejas en 5-6 km² (datos propios inéditos). Teniendo en cuenta la información disponible, la población madrileña de Alcaudón Dorsirrojo probablemente esté compuesta por 50-100 parejas.

En las próximas décadas seguramente seremos testigos de la colonización de las sierras más meridionales del sistema Central (sierras de Gredos y Gata), pero los requerimientos de esta especie harán muy difícil su expansión más al sur, o sólo de forma puntual.

AGRADECIMIENTOS

Andrés Alemany, María Teresa Carramal, Miguel Ángel Gómez Serrano, Javier López, Félix Martínez, Carlos Ponce, Óscar Pontón, Juan Ruiz, Javier Sánchez Mateos

y Roberto Sánchez Mateos aportaron interesantes datos y ayudaron en el trabajo de campo. Octavio Infante revisó el manuscrito original y con sus comentarios lo mejoró. 

BIBLIOGRAFÍA

- ✍ Barandica, J.; Sánchez, A. y Tellería, J. L. 1988. Alcaudón Dorsirrojo *Lanius collurio*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 35: 315.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2000. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2001. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.) 2002. *Anuario Ornitológico de Madrid 2001*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1999. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Pérez-Tris, J. y Bermejo, A. (ed.) 2003. *Anuario Ornitológico de Madrid 2002*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Pérez-Tris, J. y Bermejo, A. (ed.) 2003. Lista Sistemática. *Anuario Ornitológico de Madrid 2002*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De Viedma, M. (ed.) 1983. *Contribución al atlas provisional de los vertebrados de la provincia de Madrid*. Monografía n.º 27. ICONA. Madrid.
- ✍ Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzanaque, Á. y Sánchez, A. 1994 (ed.). *Atlas de las aves nidificantes en Madrid*. Agencia de Medio Ambiente y SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ Hernández, A. 1997. Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*). En: Purroy, F. (coord.). *Atlas de las aves de España (1975-1995)*: 466-467. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Hernández, A. 2003. Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*). En: Martí, R. y Del Moral, J. C. (ed.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 530-531. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- ✍ Roviralta, F. 2002. Datos sobre la Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y el Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el valle del Lozoya y Somosierra. *Anuario Ornitológico de Madrid 2001*: 72-77.
- ✍ Soto-Largo, E. 1990. Alcaudón Dorsirrojo *Lanius collurio*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 37: 350.

(Recibido 18.6.2004; Aceptado 10.8.2004)