

que animamos a todos los ornitólogos, aficionados y profesionales, a revisar una vez más sus notas de campo atrasadas.

En la Lista Sistemática 2006 se ha introducido un cambio en relación con las listas anteriores. En éstas existía un apartado final denominado “Observaciones procedentes de escapes”, en el cual no se recogían las citas de cotorra argentina ni de bengalí rojo, ya que ambas presentan poblaciones reproductoras establecidas en Madrid. A partir de este Anuario se ha creído más apropiado reemplazar este apartado por otro que se denominará “Observaciones de especies exóticas” que incluirá todas las observaciones de este grupo de especies, es decir, aquéllas no autóctonas. Por ello, todas las observaciones de especies procedentes de escapes o sueltas se incluirán en este apartado, y las observaciones de cisne vulgar, cisne negro, ganso del Nilo, tarro canelo, malvasía canela, pelicano rosado, colín de California, faisán vulgar, cotorra argentina y bengalí rojo pasan a presentarse en este apartado. De este modo, se da un trato más lógico a este conjunto de especies que son, en realidad, exóticas para la Comunidad de Madrid, ya sea por escapes, sueltas intencionadas o tengan o no poblaciones naturalizadas que se reproduzcan. En este apartado no se incluirán, al tratarse de un proceso natural, aquellas especies que han ocupado o probablemente ocuparán en el futuro el territorio madrileño por expansiones o retracciones de sus áreas de distribución, como puede ser el caso de la población reproductora de la tórtola turca, o de las cada vez más numerosas citas de garceta grande. Por otro lado, se han eliminado de la lista el chorlito dorado americano y la agachadiza real al no tener citas homologadas en Madrid (De Juana 2006).

Existen varias especies incluidas en el Listado de Rarezas (De Juana *et al.* 2006; se puede descargar el listado más actualizado en: www.seo.org/rarezas.cfm), cuyas observaciones deben ser enviadas al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para su revisión y previsible homologación. Se enviará la “ficha de rareza” a todos aquellos que la soliciten, ya que facilita la descripción del ave observada, así como la revisión de la cita por el Comité. En las especies consideradas Rareza de la Lista Sistemática se indica la necesidad de homologación al final del apartado “Criterio”.

Í N D I C E

Anátidas	116
Gallináceas	120
Colimbos	120
Somormujos y zampullines	120
Cormorán grande	121
Garzas	122
Cigüeñas	124
Morito, espátula y flamenco	124
Rapaces diurnas	125
Rálidos	131
Grullas	132
Sisón y avutarda	132
Limícolas	133
Gaviotas	141
Charranes y fumareles	147
Ganga y ortega	148
Palomas y tórtolas	149
Cucos	149
Rapaces nocturnas	150
Chotacabras	150
Vencejos	151
Martín pescador	152
Abejaruco, carraca y abubilla	152
Picos	153
Aláudidos	154
Golondrinas	154
Bisbitas y lavanderas	157
Mirlo acuático y chochín	158
Acentores	158
Túrdidos	158
Sílvicos	161
Papamoscas	166
Bigotudo y mito	166
Páridos	166
Trepador, treparriscos, agateador, pájaro moscón y oropéndola	167
Alcaudones	167
Córvidos	168
Estorninos	168
Gorriones	168
Fringílidos	169
Escribanos	170
Observaciones de especies exóticas	171

Dirección del Comité de Rarezas:

José Ignacio Dies Jambrino. Delegación de SEO/BirdLife en Valencia. Avda. de Los Pinares 106. E-46102 El Saler (Valencia). E-mail: rarezas@seo.org.

Para cada especie de la Lista Sistemática se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO): Los nombres vernáculos en castellano se han tomado del listado de nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por SEO/BirdLife (Bernis *et al.* 1994-2007; De Juana *et al.* 2007). Para las especies exóticas o procedentes de escapes se consideran igualmente estos nombres, aunque para aquellas especies en los que aún no existe un nombre recomendado se ha seguido el criterio del Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife (GAE 2006).

ESTATUS PROVINCIAL: Estatus en la Comunidad de Madrid. En el *Anuario Ornitológico de Madrid 1996* se realizó una revisión de las citas anteriores a 1996 de las especies muy escasas, para la que se consideraron los *Noticiarios Ornitológicos de Ardeola*, dos antiguas secciones de *Ardeola* [Sección Breves (Notas) y Sección Breves (Avifauna)], recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Especies Migratorias (antigua Oficina de Anillamiento) de la DGB (MIMAM), y citas recibidas anteriores a 1996. Algunos estatus provinciales se han modificado en función de la nueva información obtenida en anteriores anuarios y en otras obras recientemente publicadas.

CRITERIO: Se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas, con el objetivo de orientar al lector en el envío de observaciones para futuros anuarios. En "Citas de interés" se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el *Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid* (Díaz *et al.* 1994) o en el *Atlas de las Aves Reproductoras de España* (Martí y Del Moral 2003), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su

correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I). En el presente Anuario se ha realizado alguna pequeña modificación de criterios respecto a los anteriores, teniendo en cuenta las citas recibidas a lo largo de los últimos años. En general, los cambios restringen los criterios de publicación, ya que en ciertos casos eran demasiado amplios. Dado el volumen de citas recibidas y diversas sugerencias aportadas, se elimina en algunos casos el criterio "Todas las citas recibidas" por otros más adecuados a la situación de una determinada especie en nuestra comunidad. Para ello, también se ha tenido en cuenta el *Atlas de Aves Invernantes de Madrid 1999-2001* (Del Moral *et al.* 2002).

CITAS DE INTERÉS 2006: Se indica en cada cita localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro o de colonias, no se especifica la localidad. Bajo este epígrafe se incluyen muchas observaciones de aves comunes en el ámbito provincial pero fuera de su área de distribución habitual en Madrid.

CITAS ANTERIORES A 2006: Recoge las citas anteriores a 2006 que por su elevado interés para el conocimiento de la avifauna madrileña se considera precisa su publicación. **En el caso de citas que cambien el estatus de reproducción en alguna cuadrícula de una especie, sólo se considerarán las de los cinco años anteriores al del Anuario de referencia, a excepción de especies muy escasas o con reproducción ocasional.**

En la Lista Sistemática se sigue la nomenclatura y el orden taxonómico empleados por Clavell *et al.* (2005), el cual se basa en Voous (1977), incluyendo las actualizaciones recientes de AERC TAC (2003). Además, como se indicaba anteriormente, se han actualizado los nombres en castellano en función de las últimas revisiones (Bernis *et al.* 1994-2007; De Juana *et al.* 2007).

Se subrayan las primeras citas de una especie en la Comunidad de Madrid, tanto de 2006 como las anteriores que no estaban publicadas. Para cada especie las observaciones se ordenan por fechas, a excepción de aquellos casos en que una misma cita incluye varias observaciones de una

misma localidad, en este caso se ordena el conjunto de observaciones en función de la primera fecha.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid.
- r: Reprodutor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid.
- E: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras importantes.
- e: Estival. Habitual en primavera y verano con cifras reducidas.
- Iab: Invernante abundante.
- Ico: Invernante común.
- Ies: Invernante escaso.
- Ira: Invernante raro.
- Iac: Invernante accidental.



- P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras importantes.
 p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño) con cifras reducidas.
 S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes.
 s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas.

Generalmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ad. = adulto/s | ind. = individuo/s |
| ej. = ejemplar/es | jov. = joven/es |
| h. = hembra/s | m. = macho/s |
| inm. = inmaduro/s | pp. = pareja/s |



LISTA SISTEMÁTICA 2006

En esta lista se incluyen todas las especies citadas en la Comunidad de Madrid, tengan o no citas en 2006.

Ánsar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ánsar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 7 ind. entre el 4.I y el 1.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 3 aves el 22.I (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Valdemanco, carretera M-633, se escucha un bando en migración nocturna en dirección norte el 2.II (D. Díaz Díaz).

- Galapagar, dehesas de la ermita del Guijo, unos 15 ind. descansando a las 21:30 h el 5.II (L. Meléndez y D. García Bellido).

- Galapagar, La Navata, 90 ind. en dirección oeste el 13.II (C. Sunyer).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 113 ind. el 26.II (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- El Boalo, Mataelpino, dos bandos de 19 ind. y 4 ej. volando el 26.II (F. Roviralta).

- Galapagar, charca de El Toril, 1 jov. el 19.V y el 26.V (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Torrelodones, 1.500 ind. en dirección oeste el 27.XII (C. Sunyer).

Citas anteriores a 2006

- El Escorial, embalse de Valmayor: grupo de 30 aves, que no se corresponde con el grupo residente en el embalse, levanta el vuelo el 6.II.2002 (G. Núñez-Lagos); diversas observaciones a lo largo del año 2005: 35 ind. el 27.I, 100 ind. el 29.I, 20 ind. el 30.I y 4 ind. el 6.III (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

Barnacla Cariblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cautividad, con las poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: Ira e irregular.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: les, p con cifras muy reducidas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: zona de la depuradora, 3 m. y 2 h. se alimentan en la orilla el 8.I (J. M. Ruiz); 1 m. y 2 h. el 11.III, más de 60 aves el 19.III, y 2 m. y 2 h. el 3.XII (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 pp. el 14.XII y el 28.XII (D. Díaz Díaz).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 9 aves el 11.III y el 12.III (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 2 m. el 8.I (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 m. y 3 h. el 12.III (M. Juan/SEO-Monticola, F. Martín y D. Llorente); 31 ind. el 12.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón); 5 aves el 2.XI y 2 m. y 1 h. el 14.XII (D. Díaz Díaz); 1 m. el 16.XII (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); al menos 5 m. y 2 h. el 25.XII (J. M. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 h. el 10.XI (D. González Fernández); 1 m. el 2.XII (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 m. el 10.XI (J. M. Herranz).

Citas anteriores a 2006

- El Escorial, embalse de Valmayor, 3 m. y 3 h. el 27.II.2005, 1 m. y 1 h. el 6.III.2005 (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Leganés, parque Polvoranca, laguna de Mari Pascuala, 6 m. y 6 h. el 7.I.2002 (F. J. Ortega).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, lco.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

- Belvis del Jarama, graveras de Belvis, 2 pp. el 14.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 114 ind. el 14.I (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas, varios ej. el 12.III (M. Juan, J. de la Puente y D. Llorente/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave reposando el 19.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 m. en fase de muda el 15.VII (J. M. Ruiz).

- Velilla de San Antonio, gravera de Miralrío, 3 h. el 14.VIII (F. Martín Martín).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 4 ind. el 15.VIII (J. M. Ruiz); 1 pp. en plumaje de eclipse el 16.VIII y 4 ej. el 28.VIII (D. Díaz Díaz).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada. Sin citas de interés.

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 2 m. y 2 h. el 21.I (J. M. Ruiz); 8 m. y 8 h. el 22.I (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 3 m. y 4 h. el 3.II, 3 m. y 3 h. el 8.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 16 ind. en vuelo el 8.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 10 m. y 8 h. el 12.III (M. Juan/SEO-Monticola, F. Martín y D. Llorente); 2 h. el 5.X, 15 ind. el 12.X, 5 m. y 7 h. el 29.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ind. el 26.II (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 m. y 1 h. el 11.III, unas 20 aves el 19.III y 2 m. el 14.IV (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); zona de la depuradora, 3 m. y 2 h. el 22.IV (J. M. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 h. el 10.IV (D. González Fernández); 2 h. el 11.XI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama y S. Cuesta).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 m. y 1 h. el 20.V, 1 h. se alimenta en el río Guadalix el 15.VII y el 5.VIII (J. M. Ruiz); 2 m. y 1 h. el 2.XI (D. Díaz Díaz); 1 h. el 25.XII (J. M. Ruiz).

Citas anteriores a 2006

- El Escorial, embalse de Valmayor, 8 m. y 10 h. el 27.II.2005 (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Chinchón, laguna de San Juan, 22 ind. el 16.I.2005 y 1 m. ad. el 21.IV.2005 (Ó. Frías/Trogodytes).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.



Pareja de cercetas carretonas (*Anas querquedula*) en la orilla del embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 19 de marzo (foto: Gabriel Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 4 m. el 12.III (F. Martín, M. Juan/SEO-Monticola y D. Llorente).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 3 m. y 1 h. el 19.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 8 ind. el 1.IV, 2 m. entre el 4.IV y el 19.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda, J. L. Fuentes/Naumanni y J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 m. el 27.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 pp. el 14.IV (J. M. Ruiz).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: zona de la depuradora, 1 m. el 14.IV (J. M. Ruiz) y 1 pp. en el embalse sin indicar la zona en la misma fecha (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 703 ind. el 8.I, 800 ind. el 1.II, 1 pp. el 28.VI, 1 m. en eclipse el 13.VII, 2 h. el 18.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Velilla de San Antonio, laguna de Picón de los Conejos, más de 500 ej. el 26.II (J. J. Gómez Aparicio).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, concentración de más de 400 aves el 19.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 m. y 1 h. el 20.V, unos 6 ind. en eclipse el 5.VIII (J. M. Ruiz); más de 80 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón).

Cerceta Pardilla (*Marmaronetta angustirostris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 5 m. y 1 h. el 2.I y el 3.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 2 m., 1 h. y 1 m. híbrido de pato colorado y porrón europeo —presente en 2005— el 7.I, 7 m. y 3 h. el 14.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 15 ind. el 14.I (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 14 m. y 6 h. el 21.I (J. M. Ruiz); 9 m. y 5 h. el 17.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 m. el 12.III (M. Juan/SEO-Monticola, F. Martín y D. Llorente); 16 ind. el 15.III, 4 m. y 6 h. el 4.IV, 49 ind. el 6.IV, primera observación de 1 h. con al menos 3 patitos el 29.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 7 m. y 2 h. el 29.IV (J. M. Ruiz); 80 ind. entre los cuales al menos hay 56 m. mudando el 14.VI, y durante el periodo reproductor se observa un máximo de 9 h. distintas con pollos (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 h. con 9 pollitos el 15.VI, 2 m. y 3 h. el 10.X, 5 m. y 1 h. entre el 14.XI y el 16.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 9 m. y 3 h. el 29.XI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 6 m. y 5 h. el 12.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 7 m. y 5 h. el 22.I (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 h. el 8.X (G. Martín García, M. Roder/SEO-Sierra de Guadarrama y V. Merino).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE, 2 m. y 1 h. el 16.III, 5 m. el 14.V, 31 m. y 8 h. el 12.VI, 45 ind. el 21.VI, 57 m. y 2 h. el 1.VII, 60 m. y 1 h. acompañada de 3 jov. el 12.VII (M. Juan/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 2 m. y 2 h. el 16.III y 1 pp. entre el 7.IV (D. González Fernández) y el 14.IV (J. M. Ruiz).

- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas, 4 pp. el 3.IV (F. Martín Martín).

- Aranjuez, Puente Largo, 1 m. aguas arriba y 1 h. con 7 pollos aguas abajo del puente el 31.V (J. J. Gómez Aparicio).

- Ciempozuelos, graveras de Las Arriadas: 2 h. el 10.XI (J. M. Herranz); 1 h. el 18.XI (M. Juan y J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales en cuadrículas con reproducción no confirmada.

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 2 m. y 1 h. el 13.VII (E. Amengual, M. Á. Calvo, Á. Pérez Menchero, R. de la Peña y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela: al menos 1 m. el 28.VIII (D. Díaz Díaz); más de 60 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón).

Porrón Acollarado (*Aythya collaris*)

Estatus provincial: A extremadamente rara, con una única cita en 2002.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisas ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, gravera Duque de Albuquerque, 2 m. y 1 h. el 13.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 42 (VK59).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón).

- Ciempozuelos, graveras de Las Arriadas; 1 ind. junto con porrones europeos y moñudos el 10.XI (J. M. Herranz), que sigue el 15.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: 1 ind. el 5.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 1 m. el 19.XI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: lco.

Criterio: cifras importantes, estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsas centrales, 9 m. y 3 h. el 7.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola); balsa próxima a RNE, grupo de 26 m. y 20 h. el 12.III (F. Martín Martín).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 pp. el 14.IV (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 m. y 2 h. el 15.V (M. Juan/SEO-Monticola); 3 pp. el 20.V (J. M. Ruiz).

- Madrid, río Manzanares por encima del puente de los Franceses, 2 pp. a lo largo de junio y julio (O. Valero). Esta observación, por las fechas y localidad, probablemente corresponda a aves escapadas o liberadas intencionadamente.

Citas anteriores a 2006

- Galapagar, embalse de Las Nieves, 11 aves el 2.XI.2002 (G. Núñez-Lagos).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, graveras de Las Arriadas, 1 m. junto con porrones europeos y moñudos el 10.XI (J. M. Herranz).

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Puente Largo, 1 m. el 16.V, y 2 m. el 31.V y el 18.VI (J. J. Gómez Aparicio).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas: 2 ej. 13.IX (M. Montoto); 1 m. el 16.IX (J. M. Cebreiro).

- Ciempozuelos, graveras de Las Arriadas, 1 h. el 10.XI (J. M. Herranz).

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, lac, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

- Aranjuez, cordel de la Senda Galiana, primera cita del año, 1 m. el 26.III (M. Juan y R. Martín/SEO-Monticola).

- Pinto, arroyo Culebro, 1 pollo capturado para anillamiento el 21.V (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 76 (VK46).

Colimbo Ártico (*Gavia arctica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Colimbo Grande (*Gavia immer*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.
Sin citas recibidas.

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 23 aves y 8 nidos el 3.VI (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Pinilla del Valle, cola del embalse de Pinilla, cola con abundante vegetación herbácea encharcada y sauces, 3 nidos con ej. incubando y 3 más en construcción el 9.VI —esta zona se ha regenerado recientemente con el cerramiento de la zona para evitar el paso del ganado— (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de Las Juntas, reproducción tardía, 2 ad. en plumaje invernal con 3 pollos el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 pp. con 2 pollos de mediano tamaño el 8.XI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellirrojo (*Podiceps auritus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)

Estatus provincial: s, r, les.

Criterio: todas las citas recibidas, a diferencia de anteriores anuarios para los próximos también las de los embalses de Santillana y Pedrezuela (El Vellón). Para una correcta selección de las citas se aconseja consultar Juan (2001).

- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 2 ind. el 6.II (M. Juan/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 7 ind.

entre el 15.III y el 1.IV, 8 ind. entre el 13.IV y el 29.IV, 6 ind. el 3.VI, 2 ind. el 17.VI, 1 pp. que ceba a 1 pollo el 17.VI, 8 ind. —entre los que hay 2 pp. que alimentan a 1 y 2 pollos— el 1.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa junto a RNE: 3 ind. el 15.III (M. Juan/SEO-Monticola); 4 pp. el 29.IV (J. M. Ruiz); 9 ej. entre los cuales hay al menos 3 pp. el 14.V, 2 pp. —una con 2 pollos pequeños y la otra con 1 pollo— el 1.VII, y 1 ad. mudando el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. en plumaje estival el 22.IV (J. M. Ruiz).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ad. mudando a plumaje de invierno el 26.VIII (J. M. Ruiz).

Paño Europeo (*Hydrobates pelagicus*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1999.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*)

Estatus provincial: lab, e.

Criterio: cifras destacables, fechas extremas, observaciones estivales y citas de interés.

- Aldea del Fresno, embalse de Picadas, 1 jov. el 29.IV (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 1 ej. el 14.V (R. Riquelme).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, zona del arroyo Chozas, 1 ind. en vuelo el 2.VII (J. M. Ruiz).

- El Escorial, embalse de Valmayor: 3 inm. posados sobre poste eléctrico el 8.VII (J. M. Ruiz); entre 1 y 5 ej. en el puente de El Tercio a lo largo de todo el mes de junio (A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 6 aves descansando y posteriormente volando sobre el embalse el 28.VIII (D. Díaz Díaz).

- San Fernando de Henares, río Henares, 3 ej. el 12.IX (J. A. López Septiem).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 29.IX.2002 (F. J. Ortega).

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. el 20.IV (Ó. Frías/Troglodytes).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. el 14.III.2005 (J. L. Fuentes Serrano).

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, les.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 jov. capturado para anillamiento el 24.IX (SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 1 ej. el 26.XII (J. A. López Septiem).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, les.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Madrid, río Manzanares por encima del puente de los Franceses, entre 6 y 8 jov. y al menos 2 ad. observados repetidamente a lo largo de 2006 (O. Valero).

- Paracuellos de Jarama, Belvis de Jarama, 2 ej. el 17.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval).

- Morata de Tajuña, río Tajuña, 1 ad. volando sobre el río y posándose en la orilla el 5.IV (L. Suárez/SEO-Monticola).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 4 ind. el 28.IV (C. Sunyer).

- Madrid, barrio de Fuencarral, Las Tablas, 1 ej. volando a primera hora el 10.VII y el 18.VII (F. Roviralta).

- Madrid, puente de Segovia, 1 jov. volando al norte sobre el río Manzanares el 24.VIII (F. J. Ortega Pinilla).

Citas anteriores a 2006

- Leganés, parque Polvoranca, arroyo Recomba, 1 jov. en un sauce el 3.V.2002 (F. J. Ortega).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 jov. posados en fresnos el 24.VII.2002 (F. J. Ortega).

- Madrid, puente del Rey, 1 jov. en vuelo sobre el río Manzanares hacia la Casa de Campo el 30.VIII.2002 (F. J. Ortega).

- El Escorial, embalse de Los Arroyos, 3 ad. y 4 jov. el 27.VIII.2003 (C. Sunyer).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. el 27.IV y el 8.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ad. y 1 jov. en una pequeña gravera el 17.VI (R. Moreno-Opo, J. Seoane y M. Velázquez/SEO-Monticola).

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Madrid, M-30 a la altura del estadio Vicente Calderón, 1 ind. el 5.V (F. Barrio).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, embalse de El Pardo, 2 ind. volando sobre el río Manzanares hacia el sur el 15.VII.2002 (F. J. Ortega).

- Parla, Griñón, Humanes de Madrid y Fuenlabrada: observaciones frecuentes en grupos pequeños de 3-4 ind. o medianos de hasta 30 ind. por los cultivos de secano y retamares del oeste de Parla y noreste de Griñón, y en ocasiones al sur de Humanes de Madrid y Fuenlabrada entre el 18.IV.2005 y el 8.VI.2005 —no se observaban en años anteriores— (M. Gómez Gajete y F. J. Coronado).

- Torrejón de Velasco, 1 ej. en vuelo el 26.IV.2005 observado en Torreguillos al norte del término, posiblemente pertenezca a la población asentada entre Parla, Griñón, Fuenlabrada y Humanes de Madrid, que debe de intercambiar aves con la población asentada en el arroyo Guatén en Torrejón de Velasco (M. Gómez Gajete).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- El Escorial, Las Radas del Tercio: 1 ave el 8.IV (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama); 3 aves el 13.VII (E. Amengual, M. Á. Calvo, Á. Pérez Menchero, R. de la Peña y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 15 ind. el 8.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann); 1 ind. el 27.IV y el 10.V, y 3 ind. en plumaje nupcial 2.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Aldea del Fresno, embalse de Picadas, 3 ej. vuelan hacia la cola sur al atardecer el 29.IV (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves el 13.VI (D. Díaz Díaz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 12 ind. alimentándose a la entrada del río Guadalix el 15.VII (J. M. Ruiz).

Citas anteriores a 2006

- El Escorial, lagunas de Las Radas, unas 25 aves el 6.X.2001 (S. Jiménez Gil y G. Núñez-Lagos).

- Chinchón, laguna de San Juan, 3 ind. el 21.IV.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Garceta Grande (*Egretta alba*)

Estatus provincial: A. En los últimos años las citas se están convirtiendo en regulares.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. el 13.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ave el 11.XI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama y S. Cuesta) y posiblemente el mismo entre el 15.XI y el 20.XI (D. Díaz Díaz y J. M. Varela).

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ind. vuela hacia el norte junto con 3 garcetas comunes el 18.XI (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e escaso (se ha empezado a reproducir en Madrid a lo largo de los últimos años), lab.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 ej. anillado como pollo en Alemania en 2004 y posible reproductor en la zona el 26.IV, primeros jov. volanderos de la colonia el 30.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 jov. con anilla amarilla de lectura a distancia nacido esta misma temporada de cría en el embalse de Castrejón (Buruñón, Toledo), entre el 9.VI y el 23.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ind. el 1.V (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, se vuelve a comprobar la cría con 7 nidos (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. volando sobre el río Manzanares hacia el sur al anochecer el 15.VII.2002 y 7 aves entre ad. y jov. en el embalse el 28.VII.2002 (F. J. Ortega).

- Parla-Humanes de Madrid, 1 ind. en vuelo sobre el paraje denominado Los Arijales el 16.V.2005 (M. Gómez Gajete).

- Madrid: estación de Renfe de El Abroñigal, 3 ej. posados en un olmo el 13.XI.2005, 2 ej. el 7.XII.2005 y 12 ej. en el suelo el 9.XII.2005; Casa de Campo, 4 ind. en vuelo cerca de la boca de metro de Lago el 28.XII.2005 (M. Gómez Gajete).

No estaba citado como invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, lac. Especie en clara expansión en Madrid.

Criterio: todas las citas recibidas a excepción de las observaciones realizadas en las cercanías de áreas de reproducción (Díaz *et al.* 1994); en este caso sólo se considerarán las fechas extremas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. el 23.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. levanta el vuelo desde el río que desemboca en el embalse el 2.VIII (D. Díaz Díaz).

- El Escorial, E.D.A.R. Los Escoriales, 1 jov. el 1.IX (E. Amengual, Á. Pérez Menchero y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 2 ej. volando desde el embalse hacia el río el 15.VII.2002 (F. J. Ortega).

- Galapagar, Parquelagos, 3 ind. sobrevolando la N-VI hacia el oeste provenientes de la sierra de Hoyo el 19.VII.2002 (F. J. Ortega).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p, lra.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localizan 10 pp. de las cuales 5 inician la reproducción y sacan adelante 14 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Fuentidueña de Tajo, llanura cerealista de secano al sureste del pueblo, 14 ind. posados en un labrado el 20.IX (C. A. Martín de la Calle y L. M. Bautista).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 2 bandos de 16 y 32 ind. volando hacia el sur a las

10:00 h el 21.IX (J. Marchamalo, J. J. Gamonal, J. A. López Septiem e I. Vega/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 3 aves ciclean sobre el embalse y se alejan al oeste el 24.IX, y 2 ind. vuelan al sur el 30.IX (F. J. Ortega Pinilla).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 ad. localizado 11 días diferentes en el dormitorio de cigüeña blanca entre el 30.X y el 19.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); posiblemente el mismo ej. entre el 16.XII y el 30.XII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Citas anteriores a 2006

- Somosierra, dehesa de Somosierra, 1 ind. cruza a media altura el 2.VII.2005 (I. Pérez/Naumanni).

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población, lab.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Citas anteriores a 2006

- Casarrubuelos, nido con ad. y 3 pollos en la iglesia del casco urbano el 8.VI.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 96 (VK24).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A. Habitualmente en los pasos migratorios.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 2 ej. el 16.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 1 ind. el 24.III y 1 ind. con anilla procedente de Holanda el 27.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ind. entre el 3.VI y el 17.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).



Espátula común (*Platalea leucorodia*) en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 24 de marzo
(foto: Javier Marchamalo/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, desembocadura del arroyo de Chozas en el embalse de Santillana, 1 ej. volando junto a 12 cigüeñas blancas el 7.V (R. Riquelme).
- Velilla San Antonio, laguna Picón de los Conejos, 1 ave levanta el vuelo y se aleja hacia el sur el 11.XI (F. J. Ortega Pinilla).

Flamenco Común (*Phoenicopterus roseus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2006

- Madrid, embalse de El Pardo, 2 jov. alimentándose el 28.VII.2002 (F. J. Ortega).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas, citas estivales y citas de interés.

- Soto del Real, 2 bandos próximos de unos 30 ind. cada uno, ciclean y vuelan hacia el norte el 4.V (D. Díaz Díaz).
- Colmenar de Oreja, 8 ind. volando al norte el 6.V y 1 ind. el 20.V (M. Juan/SEO-Monticola).

- Pinilla del Valle, 1 ej. en vuelo por una zona de reproducción el 12.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Chinchón, 1 ind. volando al norte el 14.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Moralzarzal, 3 aves el 20.V (F. Roviralta).
- Cercedilla, cerro de la Peña del Sol, 8 ind. en migración el 27.V (F. Roviralta).
- Somosierra, dehesa de Somosierra, 1 pp. se reproduce en un nido en un abedul y saca adelante al menos 1 pollo en la primavera-verano (I. Pérez/Naumanni).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, les. Aparentemente en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Valdemorillo, entrada al casco urbano desde la carretera de Villanueva de la Cañada, 1 ind. el 4.IV (F. Barrio).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P, lac.

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Pinto, V.R.S.U., primera cita del año, 4 ind. el 25.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos).
- Madrid, Carabanchel Bajo, 1 ave vuela al norte el 27.II y un bando de unos 50 se dirigen hacia el nor-este el 1.III (F. J. Ortega Pinilla).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 3 ind. volando el 8.III (D. Díaz Díaz).
- Navacerrada, cerro de la Golondrina, 2 ej. hacia el puerto el 12.III (F. Roviralta).
- Madrid, Ciudad Universitaria, durante media hora pasan 25 ind. en dirección norte con fuerte viento el 24.III (J. Sánchez y H. Sánchez).
- Miraflores de la Sierra: un bando de 8 aves vuela hacia el puerto de La Morcuera el 30.III (D. Díaz Díaz); 1 ind. volando al atardecer en las proximidades de un dormidero de milano real el 30.XI (E. Alcalá Trapero y D. Díaz Díaz).
- Colmenar Viejo, V.R.S.U., 1 ej. el 7.XII (D. González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, 1 ej. el 13.XII (G. Doval).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, la población invernante parece encontrarse en claro declive.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Aranjuez, finca Sotomayor, 1 ind. el 20.IV (J. Cano).

Citas anteriores a 2006

- Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 pp. construyendo el nido el 22.III.2005 (Ó. Frías/Troglodytes). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 77 (VK56).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: A. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p, lac. Extinguida como reproductora.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pinilla del Valle, 1 ej. el 9.III y el 10.III (J. A. Vallejo y A. Espinosa).
- Lozoya, 1 subad. vuela a gran altura en dirección al puerto de Navafría el 24.V (D. Díaz Díaz).
- Guadarrama, Prado Largo, zona de pasto y fresnedas con mucho ganado vacuno y algo de caballar, 6 ad. junto a 6 cuervos el 5.X (A. Doncel Moratilla).

Citas anteriores a 2006

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ad. el 8.IV.1999 (M. Muñoz).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Madrid, barrio de Fuencarral, Las Tablas, 1 ej. el 1.III (F. Roviralta).
- Valdemoro, en una zona de cultivos de secano, 1 ad. el 15.III (J. Cano).
- San Lorenzo de El Escorial, monte Abantos: confirmada la reproducción de al menos 3 parejas, 2 de las cuales sacan adelante 1 pollo cada una, y se confirma la puesta de la tercera pareja, pero no se observa ningún pollo en visitas posteriores (J. J. López y J. C. Álvarez Ruiz/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ad. y 1 pollo en el nido situado en una ladera con roquedo el 28.V (C. Sunyer). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 37 (VK09).
- Rivas-Vaciamadrid: urbanizaciones, 1 ind. el 18.IV y otro el 10.IX (J. Marchamalo y B. Molina/SEO-Monticola); carretera de Vicálvaro a Mejorada del Campo, 1 ind. el 28.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 7 ind. volando a gran altura junto con 2 buitres negros el 22.IV (J. de la Puente, R. Martín, M. Velázquez, M. Martín Pajares, I. Otero y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, 5 ej. el 18.VI (J. Cano).
- Hoyo de Manzanares, El Picazo en la Sierra de Hoyo, 3 pp. en un posadero-dormidero situado en la

solana de la peña el 24.VI —parece ser que 1 pp. ha empezado a criar en esta nueva zona desde 2005 (F. J. Ortega Pinilla). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 39 (VK29).

- Pozuelo del Rey, cerro de los Tres Mojones, 6 ind. junto con 5 buitres negros el 17.VII (F. Segura y Agentes Forestales de la Comarca VII).

- Madrid, Moncloa, 1 ind. en vuelo hacia el sur el 20.VII (J. Sánchez y H. Sánchez).

Citas anteriores a 2006

- Torrejón de Velasco, camino de La Olivilla, 2 ind. planean sobre los cultivos —en una zona utilizada para alimentarse en primavera y verano— el 15.VI.2005 (M. Gómez Gajete).

Buitre Moteado (*Gyps rueppellii*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola*, 49: 155).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localizan 88 pp. de las cuales 70 inician la reproducción y sacan adelante 46 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2 ind. volando a gran altura junto con 7 buitres leonados el 22.IV (J. de la Puente, R. Martín, M. Velázquez, M. Martín Pajares, I. Otero y J. Pérez-Tris/SEO-Monticola).

- Pinto: 1 ej. sobrevuela el pueblo el 22.IV (R. Cordonie y F. Roviralta); campos de secano al este del pueblo, 3 ind. cicleando el 18.VI (M. Juan, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

- Pozuelo del Rey, cerro de los Tres Mojones, 10 jov. posados en el suelo en distintos grupos dispersos en una zona de olivar y terrenos cerealistas ya cultiva-

dos con una alta densidad de conejo el 12.VII, y 5 ind. junto con 6 buitres leonados el 17.VII (F. Segura y Agentes Forestales de la Comarca VII).

- Valdemoro, observación lejos de sus lugares de reproducción, 1 ad. alimentándose de un conejo el 2.VIII (J. Cano).

Citas anteriores a 2006

- Torrejón de Velasco, La Cabaña, 1 ind. se alimenta de una pequeña carroña con un buitre leonado y varios milanos negros en un área de cultivos de secano el 20.V.2005 (M. Gómez Gajete).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rascafría, 1 ej. en Cerrito Sarnoso el 10.III y reproducción confirmada en un nido sobre pino silvestre en Cabeza Mediana del que vuela el pollo en la primavera-verano (J. de la Puente/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 13 (VL22).

- Madrid, El Pardo, primera cita del año, 1 ave hacia el norte el 11.III (F. J. Ortega Pinilla).

- Pinto, V.R.S.U., 1 ind. en dirección noreste el 12.III (J. M. Ruiz, J. Marchamalo/SEO-Monticola y D. González).

- Buitrago del Lozoya, pinar de Gariñas, 1 ej. el 22.III (J. de la Puente y J. C. del Moral/SEO-Monticola).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ind. volando a gran altura el 29.III (D. Díaz Díaz).

- Villanueva del Pardillo, carretera a Majadahonda, 1 ej. cernido el 14.IX (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Majadahonda, M-50, 1 ej. descansa sobre un poste de alta tensión acosado por una urraca el 19.IX (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, les.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo de la población

reproductora madrileña en el año 2006: se localiza un total de 63 pp. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 44 ind. entran al dormitorio el 17.I, 34 ind. en el mismo dormitorio el 10.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Aranjuez, finca Sotomayor, 1 h. o jov. el 22.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 105 (VK53).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, lco.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localiza un total de 22 pp. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Aranjuez, finca Sotomayor: 1 h. el 20.I (J. Cano); 1 m. el 22.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 105 (VK53).
- Valdemoro, cultivos de secano, 1 h. el 31.I (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 89 (VK45).
- Titulcia, 1 m. el 18.XI (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 99 (VK54).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localiza un total de 102 pp. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Torrejón de Velasco, primera observación, 2 m. el 28.III (J. Cano).
- Alalpardo, Valdeolmos, 2 m. y 1 h. en vuelos de

cortejo el 2.IV y 1 ind. parcialmente melánico el 30.IV (M. Juan/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, 1 ind. melánico volando al norte el 13.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Getafe, Los Melgarejos, última observación, 1 m. el 10.VIII (J. Cano).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Moncloa, Museo de América, 1 ind. sobrevuela la zona y se va hacia el centro de la ciudad el 3.I (J. Sánchez y H. Sánchez).

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Gózquez de Arriba, 1 ind. con una presa y más tarde volando sobre el pinar el 28.IV (R. Martín y M. Juan/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, 1 ej. el 16.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 105 (VK53).

Citas anteriores a 2006

- Somosierra, dehesa de Somosierra, cría confirmada los años 1999, 2002, 2003 y 2004 (I. Pérez/Naumanni). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 2006

- Colmenarejo, Los Quemados, se localiza un nido en una encina con 3 pollos volantones el 26.V.2001 (G. Núñez-Lagos). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (VK18).

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de



Azor común (*Accipiter gentilis*) con una paloma recién capturada en Valdemorillo el 8 de junio (foto: Eduardo Gómez Marchesi).

la población reproductora madrileña en el año 2006: se localizan 27 pp., inician la reproducción 22 pp. y sacan adelante 26 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localizan 16 pp., inician la reproducción 12 pp. y sacan adelante 10 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Rivas-Vaciamadrid, cerro Coberteras-Casa Eulogio, 1 jov. sobre los cortados y zona de lagunas en vuelo hacia el este el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

Aguililla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torrejón de Velasco, primera observación, 1 ej. de fase oscura el 15.III (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ej. de fase clara el 21.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni).

- Madrid, Moncloa, junto al Pabellón de Gobierno de la Ciudad Universitaria, 1 ind. de fase clara come una cotorra argentina sobre un cedro, acosada por unas 7 urracas y unas 30 cotorras argentinas el 27.III (J. Sánchez y H. Sánchez).

- Guadarrama, 1 ej. sobrevuela las cercanías del casco urbano el 30.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Buitrago del Lozoya, pinar de Gariñas, 1 ej. sobrevuela el pinar el 31.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- El Escorial, urbanización Mojadillas, 1 ej. el 1.IV (F. Barrio).

- Aranjuez, Puente Largo, última observación, 1 ej. de fase clara el 5.X (J. Cano).

- Ciempozuelos, salinas de Espartinas, 1 ej. posado en un poste el 3.XII (J. J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ej. de fase clara en vuelo hacia el sur el 13.X.2002 (F. J. Ortega).
- Griñón, llanura al oeste del cerro del Rayo con cultivos de secano, retamares y eriales, 1 ind. cazando el 2.V.2005 (M. Gómez Gajete).
- Torrejón de Velasco, 1 ind. en vuelo cerca del límite provincial con Toledo en un área de cultivos el 25.V.2005 (M. Gómez Gajete).
- Fuenlabrada, 1 ind. en vuelo al sureste del término en una zona de cultivos de secano el 1.VI.2005 (M. Gómez Gajete).
- Humanes de Madrid, 1 ind. en vuelo sobre cultivos de secano junto al casco urbano el 8.VI.2005 (M. Gómez Gajete).

Águila-azor Perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)Estatus provincial: s reproductor muy escaso.Criterio: todas las citas recibidas.

- En el año 2006 se reproducen 2 pp. que sacan adelante 3 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)Estatus provincial: p, lac.Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave el 28.VIII (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 jov. el 10.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola); y tal vez el mismo el 26.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 1 ind. entre el 5.X y el 24.X (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumannii).

Cernícalo Primilla (*Falco naumanni*)Estatus provincial: e reproductor, lac.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localiza un

total de 271 pp. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, carretera que une Bajaras y la autopista A-1, 2 m. en zona de rastrojos y baldíos el 15.XI (C. González Villalba).

Cernícalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)Estatus provincial: S reproductor, lab.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Moncloa, Arco de la Victoria, 1 pp. cría desde hace unos 4 años, y en 2006 sacan al menos 4 pollos a pesar de las obras, volando el último pollo el 8.VII (J. Sánchez y H. Sánchez). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 62 (VK37).

Citas anteriores a 2006

- Parla, límite municipal con Humanes de Madrid, junto al cerro de La Avutardera, nido con pollos en un apoyo de una línea eléctrica el 4.V.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 88 (VK35).
- Torrejón de Velasco, camino de Esquivias, se localiza un nido con 1 ad. incubando en una torreta eléctrica el 25.V.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 97 (VK34).

Cernícalo Patirrojo (*Falco vespertinus*)Estatus provincial: A.Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Esmerejón (*Falco columbarius*)Estatus provincial: les, p.Criterio: fechas extremas y observaciones en cuadrículas de invernada no confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Aranjuez, finca Sotomayor, 1 m. el 22.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 105 (VK53).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 h. el 2.XII (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 22 (VL41).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ej. intenta capturar un murciélago el 16.I.2005 (Ó. Frías).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994; Martí y Del Moral 2003).

- Becerril de la Sierra, alto del Hito, 2 ind. aparentemente en migración el 23.IV (F. Roviralta).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 pp. en vuelo sobre el pinar el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Somosierra, puerto de Somosierra, 1 ind. cruza el puerto el 19.VIII (I. Pérez/Naumanni).

Citas anteriores a 2006

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas, 1 ind. el 11.IV.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: p extremadamente escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo y seguimiento de la población reproductora madrileña en el año 2006: se localizan 27 pp., inician la reproducción 23 pp. y sacan adelante 22 pollos (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).

- Madrid, Moncloa, observaciones frecuentes desde hace unos 5 años y en 2006 se ha formado 1 pp. (J. Sánchez y H. Sánchez).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, calle Gran Vía, 1 ad. sobrevuela la zona el 16.VII.2002 (F. J. Ortega).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: se escucha 1 ind. el 6.VIII (B. Molina, E. Escudero y O. Infante/SEO-Monticola); y otro ind. el 30.XII (SEO-Monticola).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A, con una única cita en 1996.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Madrid, parque Juan Carlos I, 6 ind. el 14.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, se escucha 1 ind. por primera vez tras la regeneración del carrizal el 12.VIII (J. Gamonal, R. Martín y P. Campos/SEO-Monticola).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, lab.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, más de 150 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 ave el 26.III (C. del Mar).

Grulla Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: les, P.

Criterio: todas las citas para aves posadas, fechas extremas y de invernada para aves en vuelo migratorio.

- Madrid: Puerta del Sol, unas 150 aves en 3 bandos paralelos con rumbo norte al atardecer el 9.II (R. Riquelme); Carabanchel Bajo, unos 40 ind. hacia el norte el 22.II (F. J. Ortega Pinilla); Ciudad Universitaria, unas 50 aves cruzan hacia el este el 28.II (J. Sánchez y H. Sánchez); Cuatro Vientos, dos bandos de unos 50 ej. cada uno el 2.III (F. J. Ortega Pinilla).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 25 ind. que llegan de noche el 14.X y se posan en la isla central, donde siguen el 15.X (P. Campos/SEO-Monticola); un bando de 18 aves ciclea a buena altura sobre el embalse, después forma en "V" y se dirigen hacia el sur el 10.XI (D. Díaz Díaz).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 20 ej. y 28 aves hacia el sur el 14.X (F. J. Ortega Pinilla).

- Leganés, parque Polvoranca, 21 aves migrando hacia el sur el 29.X (F. J. Ortega Pinilla).

- Arganda, puente de Arganda, pasan 3 bandos de 7, 25 y 26 aves en migración a baja altura, y al menos 2 ind. llegan a posarse en las explanadas frente a los edificios de RNE el 31.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Las Rozas de Madrid, 200 ind. repartidos en varios bandos vuelan en dirección suroeste el 1.XI (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 5 ind. el 1.XI (A. H. Ortega Morejón); 1 ad. llega

desde el norte y al llegar al embalse reclama, se posa en la orilla y permanece en ella media hora el 2.XI (D. Díaz Díaz).

- Madrid, Casa de Campo, un grupo de 70 ind. vuela en dirección suroeste el 8.XI (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinzal).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 90 ind. volando el 10.XI (J. M. Herranz).

- Colmenar Viejo, un bando de unas 40 aves vuela hacia el sur el 31.XI (D. Díaz Díaz).

- Chinchón, laguna de San Juan, 60 ind. en un bando con dirección suroeste el 10.XII (Ó. Frías, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Trogodytes).

- Boadilla del Monte, 3 bandos volando el 13.XII (D. Salas Rodríguez, I. Rodríguez Talavera y D. Salas).

- San Martín de la Vega, cita tardía del paso otoñal, 105 ind. volando en dirección suroeste el 16.XII (R. Moreno-Opo y M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, Carabanchel Bajo, grupo de 40 aves en vuelo hacia el suroeste el 23.XII.2002 (F. J. Ortega).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor, Ico.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Getafe, base aérea, 134 ej. el 24.I y 118 ej. el 9.XI (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, finca El Piul frente a la gravera Miralrío, 22 ej. volando río abajo el 7.VIII (F. Martín Martín).

Citas anteriores a 2006

- Humanes de Madrid, Prado de la Casa y Los Pinos, se localiza 1 h. incubando en una zona de cultivos de secano, eriales y olivar el 12.V (M. Gómez Gajete). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 88 (VK35).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Resultados obtenidos en el censo de la población madrileña en el año 2006: se localizan 1.453 ind. (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid).
- Madrid, Chamberí, 1 ind. volando hacia el norte sobre la ciudad el 13.II (F. J. Ortega Pinilla).

Ostrero Euroasiático (*Haematopus ostralegus*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p, lac.

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: observaciones invernales de 6 ind. el 2.I y 3.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 5 ind. el 8.I, 2 ej. el 10.I, 5 ind. el 12.I, 1 ej. el 14.I, 6 aves el 18.I, 8 ind. entre el 19.I y el 24.I, 7 aves entre el 3.II y el 6.II, 6 ej. el 9.II, se establece una colonia de al menos 26 nidos y los primeros pollos se ven el 2.VI, 1 ind. el 10.X (J. Marchamalo/SEO-Monticola); presencia invernal de entre 5 y 6 ind. del 19.I al 25.II, y se censan 34 nidos ocupados el 25.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).
- Rivas-Vaciamadrid, laguna Soto de las Juntas, 5 ind. el 6.II (M. Juan/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 3 ej. el 16.III (D. González Fernández); 10 ind. el 14.IV (J. M. Ruiz); 1 ind. incubando y otro con 3 pollos de pocos días el 25.VI, y 35 aves descansando en grupo el 23.VII (D. González Fernández).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación el 22.III y se censan 13 pp. el 5.V (J. Cano).
- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, unas 7 pp. entre el 28.III y el 31.V (J. Cano).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana en la zona de la depuradora, 1 ind. el 14.IV (J. M. Ruiz).
- El Escorial, lagunas de Las Radas: 5 ind. el 28.V (C. Sunyer); 6 aves el 3.VI (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsa próxima a RNE: se establece una colonia de cría en una pequeña isla, 6 ind. incubando y 2 pollos de unos días el 1.VII, que fracasa totalmente al no observarse ninguna ave —posiblemente a causa de la concentración premigratoria de cigüeñas blancas— el 12.VII (M. Juan/SEO-Monticola).
- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 ej. el 2.VIII (D. Díaz Díaz).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, grupo compacto de 19 ind. posados el 6.VIII (J. M. Ruiz).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: lac, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 10 ind. el 7.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 6 ind. el 8.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann); unos 15 ind. el 12.III (D. Llorente, F. Martín y M. Juan/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. en la zona de la depuradora el 20.V y unos 30 ind. reposan en la isleta central el 15.VIII (J. M. Ruiz).
- Guadalupe de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 5 aves nadando en aguas de profundidad media el 11.XI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama y S. Cuesta).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, cita invernal, 1 ej. el 1.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

Alcaraván Común (*Burhinus oediconemus*)

Estatus provincial: S reproductor, les.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, río Tajo cerca de Casa de Belmonte, 1 ej. emite canto el 14.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- Getafe, Los Melgarejos, primer canto nupcial el 16.II (J. Cano).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeros ej. el 12.III (M. Juan, J. de la Puente y D. Llorente/SEO-Monticola); al menos 13 ej. en campos próximos el 16.VII (P. Campos, M. Juan/SEO-Monticola y otros).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ej. el 11.II y 1 ind. el 2.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera observación, 1 ave el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, varios ind. en el río Jarama el 19.III (J. Seoane, E. Escudero, R. Martín, M. Velázquez y D. Llorente/SEO-Monticola).
- Valdemoro, encharcamientos del arroyo de La Cañada, primera observación, 4 ind. el 22.III y 2 pp. el 5.V (J. Cano).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, primera cita del año, unos 10 ind. en plumaje estival el 29.III (D. Díaz Díaz).
- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ind. en los charcos que quedan en el canal desecado el 15.IV (M. Juan/SEO-Monticola).
- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, al menos 2 pp. el 31.V (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 97 (VK34).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 26 ej. el 10.IX (M. Juan/SEO-Monticola y D. González).

Citas anteriores a 2006

- Parla, lagunas del arenero El Salmoral, humedal estacional entre cultivos de secano, varias observaciones de 1 ind. los días 2.VI.2005, 3.VI.2005 y 6.VI.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 88 (VK35).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p escaso. Se cambia su estatus de en paso muy escaso a en paso escaso debido al acúmulo de citas que evidencian un paso prenupcial y postnupcial escaso pero regular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ave en plumaje nupcial el 11.III, 2 ad. y 4 jov. el 2.IX, y 4 jov. y 1 ad. mudando el 17.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ad. en plumaje nupcial entre el 15.VIII y el 19.VIII (J. M. Ruiz); al menos 4 ej. en plumaje estival el 5.IX (D. Díaz Díaz).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. entre el 3.V y el 5.V, 4 ej. el 10.V, 5 ind. el 11.V, 1 ave el 12.V, 5 ej. el 26.V, 2 ind. el 27.V, 1 ej. el 29.V, 2 aves el 30.V y 2 ind. el 2.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 7 ind. el 3.VI, 10 ind. el 5.VIII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Paracuellos de Jarama, río Jarama frente al aeropuerto de Barajas, 1 ind. el 19.VIII (D. González Fernández).

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Es importante prestar especial atención a los jóvenes de chorlitejo que se parecen mucho entre sí, ya que en ciertas condiciones resulta complicado identificarlos a nivel específico.

Sin citas recibidas.



Chorlitoje grande (*Charadrius hiaticula*) en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 10 de mayo (foto: Javier Marchamalo/SEO-Monticola).

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: Ico, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 aves en migración activa, llegan desde el sur, se posan unos segundos y retoman el vuelo rumbo norte a gran altura, el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. observado diariamente desde el 8.V hasta el 12.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola, M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumann).

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, lab, P.

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Algete, finca Soto Mozanaque: un bando de 231 ej. y otro de 282 ind. el 9.I (C. González Villalba); 1 pp. aquerenciada en una zona encharcada el 1.V (J. M. Ruiz).

- Ciempozuelos, Soto Pajares, al menos 500 aves en cultivos el 22.I (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Valdemoro, cultivos de secano, últimos ej. invernantes el 1.III (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. el 4.V y 3 ej. el 9.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, unas 7 pp. el 31.V (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 18 ej. posados el 6.VIII (J. M. Ruiz).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. sobrevolando el río Jarama el 24.VI (J. de la Puente, P. Campos y R. Martín/SEO-Monticola).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A.



Correlimos zarapitín (*Calidris ferruginea*) adulto en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 16 de agosto (foto: Daniel Díaz Díaz).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: lac, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3 ad. en plumaje estival el 19.VII (D. Díaz Díaz); 1 ad. en plumaje nupcial el 15.VIII y 1 ad. mudando el 26.VIII (J. M. Ruiz).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío: 2 ej. el 21.VIII (F. Martín Martín); 3 jov. el 15.X (J. M. Ruiz).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Correlimos Zarapitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso, lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 2 ad. en plumaje estival mudando a invernal junto a otros limícolas el 19.VII, y al menos 4 ind. el 16.VIII (D. Díaz Díaz); 7 ad. en diferentes fases de muda el 19.VIII y 1 jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz); 1 jov. el 28.VIII (D. Díaz Díaz); 1 jov. el 2.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p escaso, lac. Se cambia su estatus de en paso muy escaso a paso escaso debido al acúmulo de citas que evidencian un paso prenupcial y postnupcial escaso pero regular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 10 ind. en plumaje de invierno el 1.III (L. Meléndez y R. Rubio).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 2 ej. 7.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ej. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 1 ej. el 5.IV y otro el 27.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 1 ind. el 29.VII (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 3



Correlimos común (*Calidris alpina*) joven en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 5 de septiembre (foto: Daniel Díaz Díaz).

aves (2 en plumaje de invierno y 1 mudando) el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ad. en plumaje nupcial el 5.VIII y 1 jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz); 1 jov. junto a otros limícolas el 28.VIII y al menos 4 jov. el 5.IX (D. Díaz Díaz); 3 jov. el 2.IX y el 17.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Algete, gravera Soto Mozanaque, 1 ind. el 29.IV (D. González Fernández).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío: 1 ad. en plumaje nupcial el 6.VIII (J. M. Ruiz); 1 ad. el 7.VIII (F. Martín Martín); 4 jov. el 8.X (G. Martín García, M. Rodero/SEO-Sierra de Guadarrama y V. Merino).

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 1 jov. el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: lac, p escaso. Se cambia su estatus de en paso muy escaso a en paso escaso debido al acúmulo de citas que evidencian un paso pre-nupcial y postnupcial escaso pero regular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 4 m. el 7.III, 1 m. y 1 h. el 10.III, 2 m.

y 1 h. el 13.III, 2 m. el 15.III, 1 ave el 24.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); entre 2 y 3 ind. del 1.IV al 13.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 4 ej. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 5 ind. el 5.IV, 4 aves el 26.IV, 6 ind. el 27.IV, 4 ej. el 3.V y 2 ind. el 5.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 2 m. iniciando la muda el 15.VII (J. M. Ruiz).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 2 aves mudando a plumaje de invierno el 19.VII (D. Díaz Díaz).

- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 2 jov. el 22.X (C. Sánchez Delicado y G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: lac.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.



Combatientes (*Philomachus pugnax*) jóvenes en una gravera de Velilla de San Antonio el 22 de octubre (foto: Gabriel Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 7 aves el 12.III (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 2 ej. 15.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: primera cita postnupcial, 2 ej. el 2.VIII (D. Díaz Díaz); 1 ind. el 15.VIII (J. M. Ruiz); 2 ind. el 2.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 4 ej. el 10.IX (D. González y M. Juan/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, cita inusual, un mínimo de 90 aves el 8.X (G. Martín García, M. Rodero/SEO-Sierra de Guadarrama y V. Merino).

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, les, p, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 1 ej. el 29.I (F. Roviralta).
- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, masa arbórea homogénea de 44 ha constituida por árboles del paraíso (*Eleagnus angustifolia*), 1 ej. oculto al lado de un tronco y camuflado entre la vegetación del suelo, que al ser descubierto a

mediodía sale en vuelo ascendente con gran agilidad para esquivar la maraña de ramas, el 3.XII (J. Rosselló). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 98 (VK44).

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p escasa, lac. Se cambia su estatus de en paso muy escasa a en paso escasa debido al acúmulo de citas que evidencian un paso pre-nupcial y postnupcial escaso pero regular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 11 ind. el 18.II y 24 ind. el 25.II (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 3 aves el 7.III, 2 ind. el 20.III, 12 ej. el 23.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ej. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 1 ind. el 5.V, 8 aves el 30.V, 2 ind. el 2.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 23 ind. el 7.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni) y 1 ej. el 9.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 ej. el 8.X (J. Salas); 1 ave el 9.X (F. Martín Martín).



Agujas colinegras (*Limosa limosa*) en las graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid) el 23 de marzo (foto: Javier Marchamalo/SEO-Monticola).

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p muy escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Oscuro (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares, 2 ind. en plumaje de verano asociados a un grupo de archibebe claros el 29.IV (J. M. Ruiz).

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p escaso, Ira.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas cen-

trales: 1 ind. el 6.III, 1 ej. el 13.III y 2 aves el 15.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ej. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 2 ind. el 11.IV, 1 ej. el 26.IV y el 27.IV, 6 ind. entre el 3.V y el 5.V, 5 aves el 8.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 3 ej. el 9.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); 4 ind. el 10.V, 6 aves el 11.V, 3 ej. el 12.V, 1 ave el 2.VI y 3 ej. el 9.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave en plumaje nupcial el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Torrejón de Velasco, encharcamientos del arroyo Guatén, 2 ind. el 28.III (J. Cano).

- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, en una zona encharcada aledaña, 6 ind. asociados a un grupo de archibebe claros el 29.IV (J. M. Ruiz).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. el 29.IV (D. González); 2 ind. el 1.V (D. González y J. M. Ruiz).

- Algete, laguna El Soto (gravera restaurada Campanero y Atayuela), 1 ind. asociado a archibebe claros el 1.V (J. M. Ruiz).

- Manzanares El Real, arroyo Samburiel: 4 ind. dispersos en la orilla el 1.V (D. González y J. M. Ruiz); 3 aves que se van al poco tiempo el 3.V (D. Díaz Díaz).

- Titulcia, soto Bayona, 1 ej. el 19.VIII (J. J. Gómez Aparicio).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 ej. el 21.VIII (F. Martín Martín).

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p escaso, Ira. Se cambia su estatus de en paso muy escaso a en paso escaso debido al acúmulo de citas que evidencian un paso prenupcial y postnupcial escaso pero regular.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 3 ind. el 8.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ind. el 8.III (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni); 2 ej. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 1 ej. el 11.IV, 3 ind. el 27.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 7 aves el 29.IV (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda, J. L. Fuentes/Naumanni y J. M. Ruiz); 2 ind. el 3.V y 3 aves el 5.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ind. el 14.IX (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Titulcia, Soto Bayona, 1 ej. el 7.IV y 2 ej. el 19.VIII (J. J. Gómez Aparicio).
- Manzanares El Real, embalse de Santillana: arroyo Samburiel, 1 ind. en plumaje nupcial el 22.IV (J. M. Ruiz); zona encharcada próxima al camping, 10 ej. el 1.V (D. González y J. M. Ruiz); 19 aves en un solo bando el 3.V (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).
- San Martín de la Vega, gravera Soto Pajares: grupo compacto de 30 ind. reposando en un banco de arena junto a 2 archibebe oscuros el 29.IV (J. M. Ruiz); 1 ave el 8.X (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama, M. Roderero y V. Merino).
- Velilla de San Antonio, gravera El Raso, 11 ind. en una zona encharcada adedaña el 29.IV (J. M. Ruiz).
- Velilla de San Antonio, gravera Picón de los Conejos, 3 ej. el 29.IV (J. M. Ruiz).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 2 ind. el 29.IV y 3 aves el 15.X (J. M. Ruiz).

- Algete, gravera Soto Mozanaque, 3 ind. el 29.IV (D. González Fernández).

- Algete, laguna El Soto (gravera restaurada Campanero y Atayuela), 2 ind. junto a un archibebe común el 1.V (J. M. Ruiz).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 jov. el 15.VIII (J. M. Ruiz); 1 ave el 16.VIII (D. Díaz Díaz); 1 jov. el 19.VIII, 1 ad. y 1 jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz); al menos 2 ej. el 28.VIII y 2 ind. el 5.IX (D. Díaz Díaz); 2 jov. mudando el 2.IX y 3 jov. el 17.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 2 ej. el 8.X (J. Salas)
- Velilla de San Antonio, graveras carretera, 3 aves el 8.X (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama, M. Roderero y V. Merino).

Andarrios Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: lco, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Algete, gravera Duque de Alburquerque, 1 ej. el 13.I (M. Juan Martínez/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 42 (VK59).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 3 aves el 15.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
 - Manzanares El Real, embalse de Santillana, primeros ej. en paso postnupcial, 2 aves el 24.VI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).
 - Algete, laguna artificial Soto Mozanaque, 1 ind. el 25.VI (D. González Fernández).
 - Titulcia, río Jarama, puente de Hierro, 4 ind. se alimentan en las orillas el 25.VI (J. M. Ruiz y J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Citas anteriores a 2006
- Leganés, charca estacional entre cultivos de secano junto al cementerio, 1 ind. el 30.I.2005 (M. Gómez Gajete). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Andarrios Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.



Andarríos bastardos (*Tringa glareola*) en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 2 de agosto (foto: Daniel Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 1 ind. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni); 1 ej. el 11.IV y el 12.IV, 1 ind. el 26.IV, 2 ej. el 3.V, 1 ind. entre el 5.V y el 11.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola).
- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: primera cita del paso postnupcial de 1 ad. en plumaje estival el 15.VII, 1 ad. y 1 jov. el 5.VIII, 1 ad. en plumaje nupcial el 15.VIII (J. M. Ruiz); 1 ind. el 23.VIII (D. González Fernández).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: al menos 5 aves el 2.VIII (D. Díaz Díaz); 2 ind. el 5.VIII (J. M. Ruiz).
- Velilla de San Antonio, gravera Miralrío, 1 jov. el 6.VIII (J. M. Ruiz).

Andarríos Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p, les muy localizado.

Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 2 ind. en la zona encharcada próxima al camping el 8.I (J. M. Ruiz). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 21 (VL31).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas

centrales, 1 ind. el 9.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, río Tajo, azud de la Aldehuela, concentración de un mínimo de 13 ej. el 10.V (J. Cano).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, un total de 26 aves el 2.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Velilla de San Antonio, río Jarama a la altura de la gravera El Raso, 1 ind. el 4.II (A. L. Neira, P. Silos Die y P. Silos Viu). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).

Vuelvepedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Falaropo Picogruoso (*Phalaropus fulicarius*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: p, les. Se ha cambiado el estatus: anteriormente se consideraba como invernante



Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 19 de noviembre (foto: Delfin González).



Gaviotas cabecinegras (*Larus melanocephalus*) adultas en el vertedero de Pinto el 19 de marzo (foto: Delfin González).

raro, pero con la información aportada por Juan *et al.* (2007) se le cambia al estatus actual.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pinto, diversas citas en el V.R.S.U.: 1 ad. el 2.I, 1 ad. y 1 ind. de primer invierno el 29.I, 1 ind. de primer invierno el 4.II, 1 ad. y 1 ind. de primer invierno el 12.II, al menos 3 aves el 18.II y 2 ad. el 19.II, 2 ad. el 4.III, 2 ind. de primer invierno el 5.III, 3 ad. —uno con anilla roja de lectura a distancia anillado como pollo en Hungría— y 2 ej. de segundo invierno el 12.III, 3 ad. —dos formando pp.— y 1 segundo invierno el 19.III, 8 ad. —entre los cuales hay 2 pp.— el 20.III, 1 ad., 2 ind. de segundo invierno —uno con anilla verde de lectura a distancia anillado como pollo en la costa atlántica de Francia— y 1 primer invierno el 25.III, 5 ad. en plumaje nupcial —dos son pp.— el 26.III, 3 ad. y 1 segundo verano —con anilla verde procedente de la costa atlántica de Francia— el 2.IV, 4 ad., 1 segundo verano y 1 primer invierno el 9.IV, 1 ad. y 2 ej. de segundo verano el 15.IV, 1 segundo verano el 24.IV, 2 ad. el 28.V, 1 primer invierno el 11.XII y 1 primer invierno el 18.XII (J. M. Ruiz, D. González, J. Marchamalo/SEO-Monticola, M. Juan/SEO-Monticola, G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama, C. Álvarez Laó, A. Sanz y G. Doval).

- Colmenar Viejo, diversas citas en el V.R.S.U.: 1 jov. el 19.VIII y el 20.VIII, 2 jov. el 25.VIII, 1 ad., 1 ind. de segundo invierno y 3 jov. el 26.VIII, 3 jov. el 27.VIII, 3 jov. el 1.IX, 1 ind. de segundo invierno y 1 jov. el 10.IX, 1 ind. de segundo invierno y 2 ind. de primer invierno el 17.IX, 1 ind. de segundo invierno el 23.IX, 1 ind. de primer invierno el 30.IX y el 1.X, 1 ad., 1 ind. de segundo invierno y 1 ind. de primer invierno el 7.X, 1 ind. de primer invierno el 12.X, 2 ind. de primer invierno el 22.X, 1 ind. de primer invierno los días 29.X, 1.XI y 4.XI, 3 ind. de primer invierno —uno con anilla roja de lectura a distancia anillado como pollo en la República Checa— el 9.XI, 1 ind. de segundo invierno y 2 ind. de primer invierno el 18.XI, 5 ind.

de primer invierno el 19.XI, 1 ind. de primer invierno el 25.XI, 1 ad., 1 segundo invierno y 2 ind. primer invierno el 3.XII, 3 ej. de primer invierno el 7.XII, 1 ad. y 3 ind. de primer invierno el 9.XII, 1 ind. de segundo invierno y 3 ind. de primer invierno el 10.XII, 2 ind. de primer invierno el 12.XII y 1 ad. el 31.XII (D. González, J. M. Ruiz, J. Marchamalo/SEO-Monticola y M. Juan/SEO-Monticola).

Gaviota Pipizcan (*Larus pipixcan*)

Estatus provincial: A con una única cita en 2002.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ind. el 22.III (L. García).

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: e, r, lab. Se cambia el estatus de sedentaria reproductora con cifras reducidas por estival con cifras reducidas y reproductora ocasional, ya que no ha habido indicios de reproducción a lo largo de los últimos años y las reproducciones confirmadas de mediados de los noventa no se han repetido. El estatus invernal se mantiene sin cambios.

Criterio: cifras importantes de invernada, citas estivales y de reproducción.

Sin citas recibidas.

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pinto, V.R.S.U.: 1 ind. de primer invierno el 2.III



Gaviota cana (*Larus canus*) de primer invierno junto a varias gaviotas reidoras y una gaviota sombría en el vertedero de Pinto el 29 de diciembre (foto: Delfin González).

(J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 ind. de primer invierno el 29.XII (D. González, J. M. Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, V.R.S.U., 1 ind. de primer invierno y 1 ad. el 31.XII (J. M. Ruiz, D. González y M. Juan/SEO-Monticola).

Gaviota Sombría (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, lab.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- Madrid, parque Juan Carlos I, 1 ad. el 14.I (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

- Getafe, cabecera de la pista 05 de la base aérea, concentración de unos 1.700 ej., la mayoría de ellos posados a la tarde el 25.II, siendo ésta la cifra más importante observada hasta el momento desde el 23.I.1997, fecha en que fue vista por primera vez como invernante en la zona (J. Cano).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, un bando toma altura y vuela hacia el norte el 8.III (D. Díaz Díaz).

- Bustarviejo, puerto de Canencia, un bando cruza el collado hacia el norte el 14.III (D. Díaz Díaz).

- Madrid, estanque de El Retiro, 1 ad. el 31.VII (J. L. González del Barrio).

- Madrid, embalse de El Pardo, cientos de ej. junto a gaviotas reidoras a la tarde el 24.VIII (F. J. Ortega).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, embalse de El Pardo, varios jov. el 28.VII.2002 (F. J. Ortega).

Gaviota Argétea Europea (*Larus argentatus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Patiamarilla (*Larus michahellis*)

Estatus provincial: Ira, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 subad. y 1 ej. de primer año el 19.III, 1 ad. el 24.VI (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Pinto, diversas citas en el V.R.S.U.: 1 ind. de primer invierno el 9.I, 1 ind. de tercer invierno el 11.I, 1 ad. el 12.I, 2 ad. el 29.I, 1 ad. el 31.I, 2 jov. y 1 ad. el 18.II, 1 ad. el 19.II, 2 ej. el 4.III, 1 segundo invierno el 10.III, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 12.III, 1 primer invierno el 19.III y el 20.III, 1 ej. mudando a segundo verano el 25.III, 1



Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) de primer invierno en el vertedero de Pinto el 18 de febrero (foto: Gabriel Martín García).



Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) de segundo invierno en el vertedero de Colmenar Viejo el 5 de marzo (foto: Delfin González).



Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*) adulta en el vertedero de Colmenar Viejo el 31 de diciembre (foto: Delfin González).

ad. el 2.IV, 1 ind. de segundo verano y 2 ind. de primer verano el 15.IV, 1 segundo verano el 3.V, 1 ind. de primer verano el 28.V, 1 ad. el 11.XII, 1 ad. y 1 primer invierno el 13.XII, 1 ad. el 17.XII, 1 segundo invierno el 18.XII, 1 primer invierno el 25.XII, 1 ind. de primer invierno y 1 ind. de segundo invierno el 29.XII (J. Marchamalo/SEO-Monticola, M. Juan/SEO-Monticola, D. González y J. M. Ruiz, C. Álvarez Laó, A. Sanz y G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Colmenar Viejo, diversas citas en el V.R.S.U.: 2 ad., 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 4.III, 1 segundo invierno y 1 primer invierno el 5.III, 5 ad. y 2 ind. de cuarto verano el 20.VIII, 2 ad. y 4 ej. de tercer verano el 25.VIII, 2 ej. de cuarto verano y 1 tercer verano el 1.IX, 2 ad. y 2 aves de segundo verano mudando a tercer invierno el 8.IX, 1 jov., 1 ind. de primer verano, 1 ind. de segundo verano y 6 ad. el 10.IX, 2 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno, 4 ind. de tercer invierno y 2 ad. el 17.IX, 1 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno, 4 ind. de tercer invierno y 2 ad. el 23.IX y 30.IX, siguen 1 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno, 5 ind. de tercer invierno y 3 ad. el 1.X, 4 ad. y 1 segundo invierno el 12.X, 2 ad., 3 tercer invierno, 2 segundo invierno y 1 primer invierno el 22.X, 1 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno y 2 ind. de tercer invierno el 26.X, 5 ad., 2 tercer invierno, 2 segundo invierno y 5 primer invierno —uno porta anilla de PVC— el 1.XI, 5 ind. de primer invierno, 2 ind. de segundo invierno, 3 ind. de tercer invierno y 1 ad. el 5.XI, 2 ind. de primer invierno, 1 ind. de segundo invierno, 1 ind. de tercer invierno y 3 ad. el 9.XI, 3 ad., 1 segundo invierno y 3 primer invierno el 19.XI, 2 ind. de primer invierno y 1 ad. el 3.XII, 4 ad., 2 tercer invierno y 1 primer invierno el 7.XII, 1 primer invierno, 1 segundo invierno, 1 tercer invierno y 1 ad. el 10.XII, 2 ind. de primer invierno, 1 ind. de tercer invierno y 2 ad. el 31.XII (D. González,

J. M. Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

- El Escorial, Las Radas del Tercio, 1 ave el 11.III (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 1 subad. el 24.VI y 1 ad. junto a gaviotas sombrías el 2.IX, 1 ave el 2.XII y 2 ej. el 16.XII (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 ad. el 15.VII (J. M. Ruiz); 1 ad. el 19.VII (D. Díaz Díaz); 2 ad. y 1 ind. de primer invierno el 25.XII (J. M. Ruiz).

- Soto del Real, embalse de Santillana: 1 ad. el 15.VIII (J. M. Ruiz); 1 tercer invierno el 18.IX (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Madrid, río Manzanares en la zona de Marqués de Vadillo, 1 ind. de tercer invierno el 14.XI (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. entre gaviotas sombrías el 20.IX.2002 (C. Sanz y J. Castro).

Gaviota Cáspera (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

- Primera cita para Madrid: Pinto, V.R.S.U., 1 ind. de primer invierno con repetidas observaciones desde enero hasta abril: el 11.I, el 26.I y el 31.I (J. Marchamalo/SEO-Monticola); el 5.II (J. Marchamalo, D. González, J. M. Ruiz, C. Sánchez y M. Juan/SEO-Monticola); el 12.II (D. González, J. M. Ruiz, J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola); el 17.II y el 18.II (J. Marchamalo/SEO-Monticola); el 4.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola, J. M. Ruiz y G. Martín); el 20.III (J. Marchamalo, D. González, J. Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola); y el 15.IV (J. M. Ruiz). Cita pendiente de ser homologada por el Comité de Rarezas.

Gavión Atlántico (*Larus marinus*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1997.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Sterna nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar de Oreja, paraje de la laguna Seca o de Las Esteras, 2 ej. el 9.V (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: 2 aves el 29.V y 1 ej. el 19.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ind. el 20.VI (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: A. Con varios intentos de reproducción a mediados de los noventa en una gravera en Velilla de San Antonio.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2006

- San Martín de la Vega, puente Pindoque-río Jarama, 1 ad. el 18.IV.2005 (Ó. Frías/Trogodytes).

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 ej. el 15.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola).



Gaviota cáspica (*Larus cachinnans*) de primer invierno en el vertedero de Pinto el 20 de marzo (foto: Delfín González).

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybrida*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 2 ind. el 11.IV, 1 ej. el 8.V, 8 aves el 29.V y 9 ind. el 15.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 ind. el 10.V, 14 ind. el 31.V (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, gravera próxima a RNE, 1 ad. el 16.VII (J. Ruiz y M. Juan/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 jov. posado en unas rocas emergentes y posteriormente volando y capturando alimento sobre la lámina de agua el 5.IX (D. Díaz Díaz).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Algete, laguna Soto Mozanaque, 2 aves el 3.V (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela, 1 ave el 17.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Citas anteriores a 2006

- San Martín de la Vega, río Jarama, puente Pindoque, 1 ad. el 18.IV.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, cita inusual de 3 aves descansando en una pradera el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

Ganga Ibérica (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Citas anteriores a 2006

- Aranjuez, paraje del arroyo de Valdepastores, un bando de 252 ind. el 21.XII.2000 y 319 ind. el día 31.I.2001 (J. Cano).



Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida*) joven en el embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) el 5 de septiembre (foto: Daniel Díaz Díaz).

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- Titulcia, cordel de la Senda Galiana, unos 100 ej. el 5.X (J. Cano).

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, lab.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernales y citas de interés.

- Madrid, Moncloa, 1 ej. con apariencia "escamosa" —presenta plumas blancas mezcladas en el cuerpo— el 1.II y 1 ind. muy oscuro, casi marrón con el pecho de tono violeta el 8.IV (J. Sánchez y H. Sánchez).

- Pinto, rastrojos próximos al V.R.S.U., unos 4.000 ind. en dos grandes bandos el 3.IX (M. Juan/SEO-Monticola).

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. con rasgos melánicos —plumaje marrón oscuro— entre decenas de aves en un dormidero situado en un álamo del soto el 30.XII (F. J. Ortega Pinilla).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor, lco. Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la tórtola de collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la tórtola collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas, excepto aquéllas realizadas en cuadrículas con reproducción posible, probable o segura (Díaz *et al.* 1994; Rodríguez 2000 y citas publicadas en el *Anuario Ornitológico de Madrid*), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción.

- Ciempozuelos, importante concentración en el tejado de una fábrica de piensos y el tendido eléctrico aledaño de un mínimo de 393 ej. el 12.XII (J. Cano).

Tórtola Europea (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, Vega Corpas, 1 ind. en un grupo de 15 tórtolas turcas el 18.XI (J. A. López Septiem).

Tórtola Senegalesa (*Streptopelia senegalensis*)

Estatus provincial: A con una única cita homologada por el Comité de Rarezas (*Ardeola*, 48: 131).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Crialo Europeo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, primera observación, 1 ej. el 1.III (J. Cano).

- San Fernando de Henares, soto del río Henares, 1 ave el 21.III (J. A. López Septiem).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 25.III (P. Campos, J. Gamonal, M. Velázquez, Á. Martín Saucedo, N. Arenal y C. López/SEO-Monticola).

Cuco Común (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, 1 ind. cantando cerca del muro del embalse el 20.III (A. Fernández García).

- Chinchón, laguna de San Juan, primera cita de la temporada, 1 ind. el 26.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Rascafría, Cabeza Mediana, 1 ej. canta en el pinar el 29.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Buitrago del Lozoya, pinar de Gariñas, 1 ej. canta el 31.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Hoyo de Manzanares, 1 ave cantando el 31.III (D. Díaz Díaz).
- Bustarviejo, 1 ind. cantando cerca del casco urbano y varios ind. en el valle el 2.IV (D. Díaz Díaz).
- Colmenar de Oreja, 1 ej. cantando el 8.IV (J. Cano).

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Autillo Europeo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor, les.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villamantilla, río Perales a la altura del molino, se oye al atardecer 1 ind. durante dos minutos el 3.I (R. Mena Rodríguez). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 72 (VKO6).
- Boadilla del Monte, río Guadarrama, se oye 1 ind. el 12.II (J. Sánchez y H. Sánchez).
- Bustarviejo, casco urbano, primera cita del año, se escucha 1 ind. el 15.III (D. Díaz Díaz).
- Alcorcón, San José de Valderas, primera cita, 1 ind. cantando en un parque el 30.III (F. J. Ortega Pinilla).
- El Escorial, urbanización Mojadillas, primer ej. oído el 6.IV (F. Barrio).
- Madrid, Vicálvaro, 1 jov. sufre un traumatismo el 25.X (P. Orejas/Brinzal).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villaviciosa de Odón, parque del Guadarrama, zona de la depuradora, 3 ind. cantando a 1 km uno de otro el 22.I, 2 ind. oídos y vistos el 12.II, y 1 ej. el 9.VII (J. Sánchez y H. Sánchez). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 73 (VK16).
- Madrid, Puerta de Hierro, 1 h. ad. con placa incubatriz choca contra los cables de una antena el 13.III, este ejemplar se reproduce en un edificio alto

del CIEMAT (Ciudad Universitaria), desde el que cae 1 pollo el 21.III, y el macho saca adelante a los dos pollos restantes (R. Alonso y P. Orejas/Brinzal).

Mochuelo Europeo (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, barrio de Fuencarral, Las Tablas, 1 ej. cantando y visto a última hora de la tarde en una de las pocas zonas que quedan sin urbanizar el 20.XII (F. Roviralta).

Cárabo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, al menos 8 pollos que corresponden a 2 pp. diferentes el 20.V (J. Cano y J. Rosselló).

Búho Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: les, r.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Getafe, base aérea, en los cultivos de cereal de secano se escucha el canto de 1 ind. durante la madrugada el 22.XII (J. Cano).

Chotacabras Europeo (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Barajas, 1 m. ad. el 12.V (R. Blanco/Brinzal).
- Fuenlabrada, polígono industrial El Cascajal, 1 h. ad. queda encerrada en el interior de una nave el 14.V (R. Alonso/Brinzal).
- Alcalá de Henares, polígono industrial de Alcalá de Henares, 2 h. ad. quedan encerradas en el interior de una nave el 16.V (P. Orejas y R. Blanco/Brinzal).

- Madrid, IFEMA, 1 h. jov. es encontrada muy debilitada el 10.X (R. Alonso/Brinzal).
- Alcorcón, 1 m. jov. es encontrado con un traumatismo severo el 26.X (P. Orejas/Brinzal).

Chotacabras Cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ind. el 14.IV (SEO-Monticola).
- Majadahonda, parque Cerro del Aire, 1 ej. cantando el 7.V y en días posteriores (R. Riquelme).
- Navalcarnero, camino del Acebuche, 1 m. ad. capturado para anillamiento el 24.IX (SEO-Monticola).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor, lac.

- Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el vencejo pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el vencejo pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del vencejo común.
- Móstoles, primera cita, 1 ind. el 20.III (J. Sánchez y H. Sánchez).
 - Getafe, primeros ej. observados el 25.III y últimos el 10.IX (J. Cano).

- Villaviciosa de Odón, urbanización El Bosque, 1 ej. vuela alto el 1.IV (R. Alonso/Brinzal).
- Madrid, Chamberí, grupos de varios ind. el 4.IV (F. J. Ortega Pinilla).
- Majadahonda, unos 30 ind. en varios grupos pequeños el 5.IV (R. Riquelme).
- Bustarviejo, casco urbano, primera cita del año, primeros ind. volando sobre la localidad el 19.IV (D. Díaz Díaz).
- Madrid, calle Príncipe de Vergara, 1 pollo caído del nido el 22.VIII (R. Alonso/Brinzal).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

- Criterio: todas las citas recibidas. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el vencejo común (*Apus apus*); véase "Criterio" en el vencejo común.
- Leganés, parque Polvoranca, primera cita, 2 aves volando hacia el norte el 19.III (F. J. Ortega Pinilla).
 - Madrid, colonia del paseo Doctor Vallejo Nájera y glorieta de Santa María de la Cabeza, primera observación, al menos 5 ind. el 19.III (M. Juan/SEO-Monticola).
 - Getafe, Los Melgarejos, en la zona de alimentación de una llanura cerealista y en las dos primeras horas de la mañana se observan las siguientes pro-



Vencejo real (*Apus melba*) adulto recogido en Cuatro Vientos el 27 de octubre (foto: Patricia Orejas/Brinzal).

porciones respecto al vencejo común: 1:60 el 28.V y 1:28 el 17.VI (J. Cano).

- Alcorcón, parque Ondarreta, 1 pollo caído del nido el 22.VI (R. Blanco/Brinzal). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (VK36).

- Rascafría, puerto de La Morcuera, 12 ej. el 13.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2006

- Parla, calle Pablo Sorózbabal, 4 ind. vuelan reclamando entre los edificios el 25.III.2005 (M. Gómez Gajete).

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rascafría, puerto de La Morcuera, 1 ej. el 13.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

- Madrid, Moratalaz, 1 jov. se introduce por la ventana de una vivienda al anochecer el 18.VIII (R. Alonso/Brinzal).

- Somosierra, puerto de Somosierra, 2 ind. en migración el 19.VIII (I. Pérez/Naumanni).

- Madrid, Cuatro Vientos, 1 ad. es recogido empapado el 27.X (P. Orejas/Brinzal).

Vencejo Cafre (*Apus caffer*)

Estatus provincial: A. La expansión de la especie y su aparición en Ciudad Real y sur de Toledo (Barrios 2003), unido a la expansión de la golondrina dáurica, deben hacernos estar atentos a posibles nuevas observaciones de vencejo cafre tras este primer indicio de reproducción.

Criterio: todas las citas recibidas.

Primeras citas para Madrid:

- Suroeste de Madrid, observación durante toda la época de cría (meses de mayo a julio) de varios individuos en una localidad al suroeste de la Comunidad, con hábitat adecuado para la nidificación debido a la abundancia de berrocales de granito y a la presencia de golondrina dáurica (L. Bolonio).

- Torrejón de Ardoz, casco urbano, un volantón es recogido del suelo el 26.X (P. Orejas/Brinzal).

Martín Pescador Común (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Abejaruco Europeo (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.



Vencejo cafre (*Apus caffer*) volantón recogido en Torrejón de Ardoz el 26 de octubre (foto: Raúl Alonso/Brinzal).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Boadilla del Monte, Monte de Romanillos, se oye un grupo el 1.IV (R. Alonso y M. J. Caballero/Brinza).
- Valdemoro, primeros ej. observados el 1.IV (J. Cano).
- Navacerrada, embalse de Navacerrada, primera observación, 1 ej. el 1.IV (F. Roviralta).
- El Escorial, urbanización Mojadillas, primeros ej. oídos el 2.IV (F. Barrio).
- Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 5 ind. el 2.IV (J. Aguilar Bosch, P. M. García y J. Martínez/Alcedo).
- Madrid, Hospital Clínico, 3 ind. posados en un chopo el 6.IV (J. Sánchez y H. Sánchez).
- Getafe, últimos ej. observados el 13.IX (J. Cano).

Carraca Europea (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas, a excepción de aquellas observaciones realizadas en época de reproducción en cuadrículas con reproducción segura (Díaz *et al.* 1994).

Sin citas recibidas.

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Torceuello Euroasiático (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, lra, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Pinilla del Valle, primer canto del año escuchado en un robledal el 7.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ej. el 8.IV (SEO-Monticola).
- Alcobendas, parque de Andalucía, 1 ej. alimentándose en el suelo el 30.XI (J. J. Gómez Aparicio).

Citas anteriores a 2006

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ej. el 5.X.2002 (C. Sanz, J. Castro y A. Lorenzo).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, barrio de Entrevías, Cerro Negro, se constata el primer intento de reproducción en los últimos 30 años, 1 pp. que construye el nido en un olmo común (*Ulmus minor*) el 11.V (J. Cano).

Picamaderos Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, El Retiro, 1 ind. el 21.XII (A. L. Neira). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 63 (VK47).

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: s en número muy pequeño y aparentemente en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas; para la zona de La Herrería (El Escorial y San Lorenzo de El Escorial) sólo citas de reproducción, a ser posible con localizaciones precisas.

- Bustarviejo, el Valle, 1 m. picotea las ramas de un rebollo en un melojar nevado junto a 1 trepador azul y 3 agateadores comunes el 28.II (D. Díaz Díaz).
- El Escorial, La Granjilla, 1 m. el 26.III (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).
- Soto del Real, en un chopo aislado moribundo en una finca edificada no habitada habitualmente (alrededor hay fresnos, melojos y bosque de ribera), se observan 3 ind. — 1 m. tamborileando y hay una breve pelea entre los 3 ind. — el 6.IV, en el mismo sitio se observan 1 m. tamborileando y 1 h. en melojos cercanos el 8.IV (R. Vega). Pasa de

no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 21 (VL31).

- Talamanca de Jarama, zona recreativa del puente romano, chopera de repoblación y bosque de ribera, se oyen 2 ind. tamborilear y luego se observa 1 pp. el 8.IV, se observa 1 h. tamborileando el 14.IV, se ve 1 h. tamborileando y más tarde 2 ind. con el mismo comportamiento el 23.IV (R. Vega). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 23 (VL51).

- Rascafría, robledal en las cercanías de vegetación de ribera del río Aguilón cerca de Las Presillas, 1 ej. observado el 31.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- El Escorial, Los Ermitaños, 1 h. ad. capturada para anillamiento el 16.IX (E. Cercadillo, J. L. Moreno y A. Cercadillo).

- Horcajuelo de la Sierra, 1 h. en un melojar el 18.XI (J. Aguilar Bosch).

- Galapagar, La Navata, urbanización con abundantes chopos enfermos, 1 m. el 26.XII que permanece en la zona hasta fin de año (C. Sunyer). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 38 (VK19).

Citas anteriores a 2006

- Horcajo de la Sierra, 1 ind. en el arroyo con fresnos y robles al sur del pueblo el 2.VII.2004 (M. Juan/SEO-Monticola).

Calandria (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Terrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, cita muy temprana, de 3 a 5 aves el 11.III (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Colmenar de Oreja, paraje de la laguna Seca o de Las Esteras, 1 ej. el 2.V (J. Cano).

Terrera Marismeña (*Calandrella rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fuentidueña de Tajo, 1 ej. con las rectoras albinas el 20.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alondra Totovía (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemoro, pseudoestepas de El Espartal, primer canto territorial el 12.III (J. Cano).

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Getafe, últimos ej. invernantes el 25.III (J. Cano).

- Colmenar de Oreja, primeros ej. invernantes el 21.X (J. Cano).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales: primeros ej. de la temporada el 8.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola y G. Doval); se censan más de 2.000 pp. en el periodo reproductor (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 2 ind. volando sobre el río Jarama el 12.III (M. Juan, J. de la Puente y D. Llorente/SEO-Monticola); se observan numerosos bandos a lo largo de la maña-

na el 19.III (J. Seoane, R. Martín, M. Velázquez, D. Lorente y E. Escudero/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, unos 30 ind. en la colonia de cría el 15.III (F. Martín, M. Juan/SEO-Monticola y D. Lorente).

Avión Roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, observaciones invernadas, 1 ind. el 13.I, 3 ej. entre el 17.I y el 21.I, unos 50 ej. el 1.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

- Madrid: puente de Segovia, primera cita anual, unos 5 ej. el 17.II (F. J. Ortega Pinilla); plaza de Marqués de Vadillo, 2 ej. el 3.III (M. Juan/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Mar de Ontigola, primera observación del año, 1 ej. el 18.II (J. J. Gómez Aparicio).

- El Escorial, lagunas de Las Radas, unos 4 ind. el 1.III (L. Meléndez y R. Rubio).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, primera cita del año, 1 ind. volando sobre una pequeña charca el 2.III (D. Díaz Díaz).

- Navacerrada, cerro de la Golondrina, 1 ind. el 12.III (F. Roviralta).

- Chinchón, laguna de San Juan, 15 ind. en un bando el 12.III (E. Cercadillo y J. L. Moreno/Troglodytes).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 híbrido de golondrina común y avión común capturado para anillamiento el 21.IX (J. Marchamalo, J. Gamonal, J. A. López Septiem e I. Vega/SEO-Monticola).

- Valdemoro, últimos ej. observados el 6.X (J. Cano).

- Madrid, cabecera del embalse de El Pardo, varios ind. el 7.X (R. Riquelme).

- Rivas-Vaciamadrid, Soto de las Juntas-Casa Eulogio, varios ind. en paso junto a un grupo de aviones comunes el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

Citas anteriores a 2006

- Tres Cantos, 1 ej. el 21.II.2002 (C. Sanz y T. Perdiguero).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas: 1 ind. sobre el río Jarama el 19.III (J. Seoane, E. Escudero, R. Martín, M. Velázquez y D. Lorente/SEO-Monticola); 5 ind. el 16.IX (M. Juan y P. Campos/SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, 1 pp. tiene el nido bajo un puente de la carretera M-45 el 9.VI (J. A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

Citas anteriores a 2006

- Somosierra, casco urbano, 1 nido ocupado en un túnel bajo la antigua N-1 en la primavera de 2005 (I. Pérez/Naumanni). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 2 (VL55).

- Torrejón de la Calzada, camino de Cubas, 1 pp. construye un nido en el alero de un chalet el 25.IV.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 88 (VK35).

- Fuenlabrada, barranco de las Gazaperas, 1 pp. vuela por la zona el 25.V.2005 (M. Gómez Gajete).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Madrid, puente de Segovia en el río Manzanares, primera cita anual, unos 10 ind. el 17.II (F. J. Ortega Pinilla).



Híbrido de golondrina común y avión común (*Hirundo rustica* x *Delichon urbica*) capturado para anillamiento en el Caserío del Henares (San Fernando de Henares) el 21 de septiembre (fotos: Javier Marchamalo y Javier Gamonal/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 18.II (SEO-Monticola).
- Valdemoro, primeros ej. observados el 28.II y últimos el 1.X (J. Cano).
- Madrid, colonia en una urbanización de la calle Pescara, primera cita del año, 1 ind. el 3.III (M. Juan/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, 1 ind. el 5.III (J. A. López Septiem).
- Bustarviejo, casco urbano, primera cita del año, 1 ave volando en las proximidades de un nido el 15.III. (D. Díaz Díaz).
- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, 1 híbrido de golondrina común y avión común capturado para anillamiento el 21.IX (J. Marchamalo, J. Gamonal, J. A. López Septiem e I. Vega/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, soto de Las Juntas-Casa Eulogio, un grupo numeroso en paso junto a golondrinas comunes el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).
- Alcorcón, última observación, 1 ave en paso por la tarde el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, Carabanchel Bajo, calle General Ricardos, 1 ave volando alto hacia el sur, ciclea por la zona y continua el vuelo el 2.XII.2002 (F. J. Ortega).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, finca Sotomayor, primer ej. observado el 20.IV (J. Cano).
- Getafe, últimos ej. observados el 17.IX (J. Cano).

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, 1 ej. en paso migratorio el 24.III (J. Cano).
- Nuevo Baztán, 1 ind. de segundo año capturado para anillamiento el 1.IV (J. Gamonal, I. Vega y otros/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, cerro de La Marmota, 2 ind. el 2.IV (J. Aguilar Bosch, P. M. García y J. Martínez/Alcedo).
- Buitrago del Lozoya, Gariñas, 1 ave cantando en un pinar de pino resinero el 17.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Bisbita Pratense (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: lab, P.

Criterio: fechas extremas.

- Valdemoro, zona de cultivos de secanos, últimos ej. invernantes el 5.IV y primeros el 16.X (J. Cano).
- Citas anteriores a 2006
- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, primeras observaciones el 7.X.2002 (C. Sanz).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, les.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 19.III (SEO-Monticola).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- Soto del Real, embalse de Santillana, primera cita del año, al menos 2 ind. junto a varias lavanderas blancas el 27.III. (D. Díaz Díaz).
- Guadalix de la Sierra, río Guadalix, 1 ind. de la subsp. *flava* se alimenta en la orilla el 1.IV, 1 ad. de la subsp. *flava* junto a varios jov. el 26.VIII (J. M. Ruiz).
- Getafe, primeros ej. en paso migratorio el 2.IV (J. Cano).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, balsas centrales, 1 m. el 4.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola y A. Blanco/Naumanni).
- Pinilla del Valle, cola del embalse de Pinilla, cola con abundante vegetación herbácea encharcada y sauces, varios m. cantando y defendiendo territorio

el 9.VI —esta zona se ha regenerado recientemente con el cerramiento de la zona para evitar el paso del ganado— (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Manzanares El Real, embalse de Santillana, 35-40 aves, incluyendo ej. de la subespecie *flava*, *iberiae* y al menos 2 *flavissima* el 20.IX.2002 (C. Sanz y J. Castro).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Valdemoro, barrio de El Restón, un dormitorio ubicado sobre las azoteas de varios edificios alberga más de 100 ind. la tarde del 26.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2006

- Parla, 1 ej. alimentándose en el césped de un jardín del casco urbano en el barrio de la Ermita el 19.V.2005, y 1 ad. y 1 jov. en un campo de cultivo roturado junto al camino Parla-Móstoles en la misma fecha (M. Gómez Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 88 (VK35).

Mirlo-acuático Europeo (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chochín Común (*Troglodytes troglodytes*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Fernando de Henares, río Henares, 1 m. con protuberancia cloacal capturado para anillamiento el 4.VI (J. A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 64 (VK57).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 4.II y primeras capturas en paso otoñal o invernada de 1 ind. el 28.X (SEO-Monticola).

- Getafe, 1 ej. el 26.XII (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 75 (VK36).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso, les.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Robledo de Chavela, cerro de la Almenara a 1.200 m de altitud, 3 ej. el 23.XII (J. A. Calleja, E. Herguido/SEO-Monticola y otros).

Citas anteriores a 2006

- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 1 ave el 22.XII.2002 (C. Sanz).

Alzacola Rojizo (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Petirrojo Europeo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 1 ind. el 19.III, primera captura en paso otoñal el 30.IX y el pico de paso con 7 ind. el 10.XI (SEO-Monticola).

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, últimos ej. invernantes el 24.III y primeros el 15.IX (J. Cano).

- San Fernando de Henares, río Henares, 1 m. con protuberancia cloacal y 1 jov. colicorto capturados para anillamiento el 4.VI (J. A. López Septiem).

Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

- Madrid, Piovera, 1 ind. el 26.VI (D. Lorenzo Roviralta y A. Lorenzo Roviralta).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, primera observación, 1 m. cantando el 4.IV (J. Cano).

- Robledo de Chavela, cercanías del cerro de la Almenara, 1 ej. canta el 9.IV (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura primaveral de 1 ave el 13.IV, primeros jov. el 17.VI y última captura de 1 jov. el 24.IX (SEO-Monticola).

- El Escorial, urbanización Mojadillas, primer ej. oído el 15.IV (F. Barrio).

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, primera cita del año, 1 ave cantando el 20.IV (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primeros jov. el 4.VI (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Torrejón de Velasco, arroyo de la Peñuela, 1 m. cantando en una olmeda junto al arroyo el 20.V.2005 (M. Gómez Gajete). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 97 (VK34).

Ruiseñor Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, les, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial el 4.II y primera captura en paso otoñal el 1.IX, pico de paso el 30.IX con 5 capturas, y se capturan en invernada (enero, febrero y diciembre) 6 aves (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, primera captura

para anillamiento en paso postnupcial de 1 h. jov. el 1.IX (Ó. Frías/Troglodytes).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Gatafe, últimos ej. como invernantes el 17.III (J. Cano).

- Valdemoro, casco urbano, continúa aumentando el núcleo reproductor, 4 pp. el 12.V (J. Cano). Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 98 (VK44).

Citas anteriores a 2006

- Valdemoro, núcleo reproductor en el casco urbano, 1 pp. el 17.V.2004 y 2 pp. el 20.IV.2005 (J. Cano).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdelaguna, El Bosque, captura para anillamiento de 1 h. de segundo año el 1.IV (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

- Valdemoro, pseudoestepas de El Espartal, 1 h. el 4.IV (J. Cano).

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, 1 m. se mueve discretamente entre las jaras de un melojar el 20.IV (D. Díaz Díaz).

- Rivas-Vaciamadrid, captura para anillamiento de 1 h. el 8.V (SEO-Monticola).

- Canencia, puerto de Canencia, 1 jov. capturado para anillamiento el 12.VIII (J. A. Calleja y otros/SEO-Monticola).

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ind. el 2.X (J. M. Herranz).

- San Martín de la Vega, Los Albardales, captura para anillamiento de 1 jov. el 12.X (R. Moreno-Opo y otros/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 2 aves el 28.X.2002 (C. Sanz y J. A. Sanz).

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: e muy escasa en la Sierra, Iac, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, Vacibotas, 1 m. el 21.III (J. A. López Septiem).

- Aranjuez: 1 m. en un campo de regadío junto al río Jarama el 17.IV (A. Villares); finca Sotomayor, primeros ej. observados en paso migratorio prenupcial el 20.IV (J. Cano); Las Infantas, 1 h. el 23.IV (J. J. Gómez Aparicio).

- Valdemoro, cultivos de secanos, densidad máxima de 0,6 aves/10 ha el 11.IX y últimos ej. el 3.X (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 2 jov. el 16.IX y última de 1 h. jov. el 8.X (SEO-Monticola).

- Getafe, barbechos y eriales de la base aérea, densidad máxima de 2,5 aves/10 ha el 17.IX y el 23.IX (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, soto de Las Juntas-Casa Eulogio, 1 ad. en plumaje otoñal el 21.X (F. J. Ortega Pinilla).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas en paso otoñal de 3 m. jov. el 21.X (SEO-Monticola).

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, cultivos de secanos, primera observación de 1 m. el 1.III y última de 1 ej. el 6.X (J. Cano).

- Aranjuez, cordel de la Senda Galiana, 1 m. el 26.III (R. Martín y M. Juan/SEO-Monticola).

- Rascafría, Cerrito Sarnoso, 1 ej. en un claro rocoso con pastizal rodeado de pinar el 27.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Rascafría, puerto de La Morcuera, 1 ave volando el 30.III (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2006

- Colmenar Viejo, dehesa de Navalvillar, 4 aves el 7.X.2002 (C. Sanz y T. Perdiguero).

- Leganés, 1 h. en el nuevo parque urbano Bosque Sur, y 1 pp. en un área de cultivos de secano en repoblación el 28.VI.2005 (M. Gómez Gajete y F. J. Coronado).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, pseudoestepas de El Espartal, 1 pollo volandero con boqueras el 23.VI (J. Cano). Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 98 (VK44).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: Ira, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, lab.

Criterio: sólo citas de interés.

- Getafe, primer canto territorial el 13.II (J. Cano).

- Valdemoro, en los diferentes hábitats del término municipal (64,2 km²), se han detectado unos 44

m. territoriales, de los que 39 se localizaban en los parques y jardines del casco urbano entre marzo y abril (J. Cano).

- Navacerrada, cerro de la Golondrina, 1 ej. con albinismo parcial en cola e infracobertoras caudales el 13.IV (F. Roviralta).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 22.IV (SEO-Monticola).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios sólo observaciones en cuadrículas con invernada no confirmada y fechas extremas.

- Colmenar de Oreja, sotos del río Tajo, 2 ej. junto a zorzales comunes el 13.I (J. Cano). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 106 (VK63).

- Bustarviejo, cuerda de El Marraz, un bando laxo de 20 ó 30 aves se alimenta en un pional con enebro rastrero el 14.III (D. Díaz Díaz).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, lab, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, última captura en paso prenupcial con 2 ad. el 12.III, y primera en paso otoñal o invernada con 2 jov. el 28.X (E. Cercadillo, J. L. Moreno, A. Cercadillo, Ó. Frías, J. Fernández y A. García).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en paso prenupcial el 19.III, y primera en paso otoñal o invernada el 14.X, pico de paso con 11 jov. el 10.XI (SEO-Monticola).

- Madrid, El Retiro, 1 ind. el 19.III (A. L. Neira y P. Silos).

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, últimos ej. invernantes el 24.III y primeros el 16.X (J. Cano).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, última captura en

paso prenupcial con 5 ad. el 13.III.2005, y primera en paso otoñal o invernada con 1 jov. el 23.X.2005 (E. Cercadillo y A. Cercadillo).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: lco, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, diversas capturas para anillamiento a lo largo del invierno: 4 ind. el 4.I, 4 ind. el 15.I, 2 ind. el 21.I, 2 ind. el 4.II y 1 ind. el 12.III (J. L. Moreno, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 99 (VK54).

- El Boalo, un bando de unas 20 aves vuelan hacia el norte el 16.II (D. Díaz Díaz).

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, lco.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cetia Ruiseñor (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. el 10.VI (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. capturado el 3.VI (SEO-Monticola).

Cisticola Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

Sin citas recibidas.

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Los Albardales, capturas para anillamiento el 23.IV y el 12.X (SEO-Monticola).

- Getafe, arroyo Culebro, 1 ind. cantando al amanecer el 1.V (M. Juan/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ad. el 6.V (SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, capturas en paso postnupcial de 1 ind. el 26.VIII, el 10.IX y el 24.IX (SEO-Monticola).
- Nuevo Baztán, 1 ej. capturado para anillamiento el 26.VIII y el 2.IX (J. Gamonal, I. Vega y N. Arenal/SEO-Monticola).
- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, 3 ej. el 29.VIII (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. y 1 ad. capturados para anillamiento el 2.IX (Ó. Frías y J. L. Moreno/Troglodytes).
- Zarzalejo, arroyo de Los Palacios, finca El Bierzo, 1 ad. capturado para anillamiento el 10.IX (J. A. Calleja y otros/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- El Escorial, Los Ermitaños, 1 jov. capturado para anillamiento el 17.IX.2005 (E. Cercadillo, J. L. Moreno y A. Cercadillo/Troglodytes).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Reproductor muy localizado.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 m. cantando el 12.III (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 m. ad. capturado para anillamiento el 28.III y el 15.VI (Ó. Frías, E. Cercadillo, A. Cercadillo, J. Fernández y F. Lorenzo/Troglodytes); 2 m. cantando el 30.IV (J. Marchamalo/SEO-Monticola, D. González y J. M. Ruiz); 1 m. cantando el 10.V, el 11.V y el 29.V (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 2 m. cantando el 1.VII (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola); 2 m. cantando el 4.VII, 1 jov. capturado para anillamiento el 21.VII, 1 ad. anillado el 24.VIII, 3 jov. anillados el 11.IX, el 17.IX y el 29.IX (Ó. Frías, E. Cercadillo, A. Cercadillo, J. Fernández y F. Lorenzo/Troglodytes). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 99 (VK54).

- Algete, laguna artificial Soto Mozanaque: 1 ind. cantando y después visto el 2.IV (M. Juan/SEO-Monticola), y el 7.IV (D. González).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal: balsas centrales, 2 m. cantando el 9.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola y E. Castillejos); se censan más de 10 pp. en el periodo reproductor (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 77 (VK56).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura en paso postnupcial de 1 jov. el 26.VIII (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. el 14.IV.2005, el 21.IV.2005 y el 14.VII.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Carricerín Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. capturado para anillamiento el 29.X y otro el 26.XII (Ó. Frías, J. L. Moreno, J. Fernández, A. García, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. capturado para anillamiento el 6.XII.2005 (Ó. Frías, J. L. Moreno, E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

Carricerín Cejudo (*Acrocephalus paludicola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricerín Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto en las zonas de paso habitual donde el criterio se debe reducir a las primeras y últimas citas de cada paso migratorio, así como a los picos de migración. Para

información detallada acerca del paso migratorio de la especie por Madrid se puede consultar Bermejo y De la Puente (2002).

- San Fernando de Henares, río Henares, 1 ind. el 27.III (J. A. López Septiem).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ave en paso prenupcial el 1.IV, se capturan sólo 9 aves en todo el paso prenupcial, la última con 3 ind. el 22.IV, primera captura en paso postnupcial de 2 ind. el 16.VII, y se capturan sólo 10 aves en todo el paso postnupcial, con la última captura el 1.IX (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 jov. capturados para anillamiento el 30.IX (Ó. Frías, J. L. Moreno, N. Baniandrés, J. Fernández y A. García/Troglodytes).

Carricero Agrícola (*Acrocephalus agricola*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Carricero Políglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, río Henares 1 ej. cantando el 21.III (J. A. López Septiem).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 1 ind. el 25.III, primer jov. el 11.VI, pico de paso postnupcial con 46 aves el 26.VIII y última captura con 1 jov. el 28.X (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, primera captura

para anillamiento de 1 ad. el 26.III y última de 3 jov. el 29.X (E. Cercadillo, A. Cercadillo, Ó. Frías, J. L. Moreno, J. Fernández y A. García/Troglodytes).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p, lac.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura el 22.IV, primer jov. el 9.VII, y última captura de 1 jov. el 30.IX (SEO-Monticola).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Políglota (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P. Para información detallada acerca de la fenología y parámetros demográficos de la especie en Madrid se puede consultar Bermejo *et al.* (2002).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, captura de 2 ind. el 7.IV, y última de 1 jov. el 19.IX (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

- Madrid, primeros ej. observados el 9.IV (J. Cano).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura el 13.IV, y última captura de 1 jov. el 10.IX (SEO-Monticola).

- Valdemoro, últimos ej. observados el 31.VIII (J. Cano).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Curruca Tomillera (*Sylvia conspiciolata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, finca Sotomayor, primer ej. observado el 20.IV (J. Cano).

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, El Milanillo, primera observación de 1 m. en una fresneda adhesionada con encinas y zarzas el 11.III (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- El Escorial, primera observación, 1 ej. 26.III (F. Roviralta).

- Guadalix de la Sierra, alrededores del embalse de Pedrezuela, primera cita, 1 m. cantando el 29.III (D. Díaz Díaz).

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, 2 jov. y 1 ad. el 19.IX (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

- El Escorial, Los Ermitaños, 1 h. capturada para anillamiento el 1.X (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Boadilla del Monte, arroyo Romanillos, 1 ej. de segundo año capturado para anillamiento el 8.IV (J. A. Calleja y otros/SEO-Monticola).

- Robledo de Chavela, cercanías del cerro de la Almenara, 1 ej. canta en un enebro el 14.IV (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Rascafría, primer m. cantando en un área arbustiva en el borde del robledal el 27.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, zona del Hospital Clínico San Carlos, 1 m. el 8.V (J. Sánchez y H. Sánchez).

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, 1 jov. el 12.IX (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

Curruca Zarcerilla (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 1.IV y última el 13.V, primera en paso postnupcial de 1 jov. el 12.VIII y última captura de 1 jov. el 8.X (SEO-Monticola).

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, captura de 1 ind. en paso prenupcial muy tardío el 6.VI (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

- Titulcia, cordel de la Senda Galiana, 1 ej. el 5.X (J. Cano).

- Madrid, Casa de Campo, arroyo Meaques, captura para anillamiento de 1 ad. el 10.X (J. Yáñez y otros/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Manzanares El Real, cercanías del embalse de Santillana, 1 m. el 20.IX.2002 (C. Sanz y J. Castro).

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, 1 ad. el 15.IV (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer anillamiento en paso prenupcial

de 3 ind. el 22.IV y última captura de 1 ind. el 20.V, primera en paso postnupcial de 2 ind. el 19.VIII y última captura de 4 ind. el 30.IX (SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. capturado para anillamiento el 14.X (E. Cercadillo y A. Cercadillo/Troglodytes).

- Madrid, Casa de Campo, arroyo Meaques, captura para anillamiento de 1 jov. el 19.X (J. Yáñez y otros/SEO-Monticola).

Curruca Capirota (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial con 2 ind. el 25.III y última de 1 ind. el 29.IV, primera captura en paso postnupcial de 1 jov. el 10.IX, pico de paso con 24 ind. el 8.X, se capturan varias aves a lo largo de noviembre y diciembre (SEO-Monticola).

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, captura para anillamiento de 1 ind. el 5.IV (SEO-Monticola).

- San Fernando de Henares, Caserío del Henares, captura para anillamiento de 1 ind. el 7.IV, y última captura de 1 jov. el 10.VIII (SEO-Monticola).

- Pinilla del Valle, primer canto del año escuchado en un robledal el 7.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, primer ej. observado el 8.IV (J. Cano).

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, numerosas aves en un melojar el 20.IV (D. Díaz Díaz).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro. Se recomienda tener especial cuidado en la identificación de esta especie dado que su ruta migratoria habitual se encuentra más hacia el este. Muchos machos adultos de mosquitero musical

(*Phylloscopus trochilus*) se parecen bastante a esta especie, tanto en tamaño como en colorido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mosquitero Ibérico (*Phylloscopus ibericus*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Escorial, Los Ermitaños, 1 ind. capturado para anillamiento el 12.VIII y otro el 19.VIII (E. Cercadillo/Troglodytes).

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 jov. capturado para anillamiento el 2.IX (O. Frías y J. L. Moreno/Troglodytes).

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, Ico, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial con 2 ej. el 1.IV, primera captura en paso otoñal con 12 ind. el 8.X, y pico de este paso con 27 capturas el 26.XI (SEO-Monticola).

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial el 13.IV y últimas el 29.IV, primera captura en paso postnupcial el 6.VIII, máximo de paso con 13 capturas el 10.IX, y última el 14.X (SEO-Monticola).

- Titulcia, cordel de la Galiana, 1 ej. el 5.X (J. Cano).

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, les.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

Sin citas de interés.

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapilla*)Estatus provincial: S, Ico.Criterio: fechas extremas en zonas de invernada o paso y citas de interés.

- Torrejón de Velasco, pinar de Bomberos de Castilla, últimos ej. observados el 15.III (J. Cano).
- Valdemoro, pinar del cerro de La Mira, primeros ej. invernantes el 22.IX (J. Cano).

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)Estatus provincial: e, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama junto a la depuradora, 1 jov. el 9.VII (J. Sánchez y H. Sánchez).
- Leganés, parque Polvoranca, 1 jov. capturado para anillamiento el 8.X (Á. Díaz/SEO-Monticola).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)Estatus provincial: E, P.Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Titulcia, soto Bayona, 1 m. el 7.IV (J. J. Gómez Aparicio).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura en paso prenupcial, 1 ej. el 9.IV (SEO-Monticola).
- Rascafría, primer m. cantando en zona de reproducción en un pinar de pino silvestre el 17.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Getafe, primeros ej. observados en paso prenupcial el 30.IV y últimos el 2.V, primeros ej. en paso postnupcial el 24.VIII y últimos el 17.X (J. Cano).
- San Fernando de Henares, río Henares, primera cita postnupcial, 1 ind. el 3.VIII (J. A. López Septiem).
- Valdemoro, se obtienen las siguientes densidades máximas: 0,3 aves/10 ha en secanos, 1,9 aves/10 ha en retamares, 8,9 aves/10 ha en pinares y 24,5 aves/10 ha en parques urbanos durante septiembre (J. Cano).
- Madrid, cabecera del embalse de El Pardo, varios ind. el 7.X (R. Riquelme).
- Nuevo Baztán, El Perete, 1 jov. capturado para anillamiento el 14.X (J. Gamonal y otros/SEO-Monticola).

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)Estatus provincial: r, A, Ira.Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan: 1 h. ad. capturada para anillamiento el 4.I y el 22.I, 1 pp. observada el 15.III y otro ind. el 28.III (J. L. Moreno, E. Cercadillo, A. Cercadillo, Ó. Frías, J. Marchamalo, J. Fernández y A. García/Troglodytes); 1 pp. el 28.II y el 26.III, 3 jov. volanderos el 26.VI (J. Marchamalo/SEO-Monticola); 1 m. el 1.VII (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola); grupo de 1 ad. y 3 jov. del año el 4.VII, 2 pp. capturadas para anillamiento el 29.IX, 2 ind. observados el 30.XII (J. L. Moreno, E. Cercadillo, A. Cercadillo, Ó. Frías, J. Marchamalo, J. Fernández y A. García/Troglodytes). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 99 (VK54).
 - Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, se censan más de 7 pp. en el periodo reproductor (M. Fernández, A. Blanco, P. García, I. Pérez, L. Ameigenda y J. L. Fuentes/Naumanni).
 - San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, se oye el reclamo de 1 ind. el 1.VII (J. Marchamalo, J. Pérez-Tris, M. Juan, C. López y J. Yáñez/SEO-Monticola).
- Citas anteriores a 2006
- Chinchón, laguna de San Juan, 2 pp. el 10.III.2005, 1 m. ad. el 14.III.2005 y el 21.IV.2005, 1 ind. el 14.VII.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Mito (*Aegithalos caudatus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)Estatus provincial: S.Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, zona del Hospital Clínico San Carlos, 1 ind. el 12.I y el 19.I e intentos de cría el 21.IV y el 25.IV (J. Sánchez y H. Sánchez). No estaba citado como invernante y pasa de reproductor posible a probable en la cuadrícula 62 (VK37).

Citas anteriores a 2006

- Madrid, Casa de Campo, 1 ind. junto a la valla noroeste integrado en un bando mixto de páridos el 6.XII.2005 (M. Gómez Gajete). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 62 (VK37).

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Fernando de Henares, plaza España, 1 pp. cebando a pollos colicortos el 29.V (J. A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

Herrerillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, primer jov. del año el 30.V (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdelaguna, Estación de Anillamiento de El Bosque, primeros jov. del año el 30.V (J. Yáñez e I. Otero/SEO-Monticola).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: Iac.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, Ico.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primer jov. el 11.VI (SEO-Monticola).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E. Las observaciones en fechas inusuales (invierno fundamentalmente) de aves detectadas exclusivamente por el canto no se publicarán dada la habitual confusión con imitaciones y emisiones de estorninos negros. Se debe considerar que la llegada de esta especie suele producirse en la primera quincena de abril.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares, primera cita del año, varios ind. volando entre la vegetación de ribera el 22.IV (D. Díaz Díaz).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso en la sierra, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Soto del Real, mosaico de prados, fresnedas, con abundantes arbustos (rosal silvestre, zarza), 1 m. cantando en un arbusto el 23.V (R. Vega). Pasa de no reproductor a reproductor probable en la cuadrícula 21 (VL31).

- Navacerrada, río Navalmedio, 1 m. ceba a 1 jov. y se ve otro m. en matorrales cercanos al borde de un pinar el 22.VII (F. Roviralta).

Citas anteriores a 2006

- Somosierra, Quiñón de la Cerrada, 1 pp. alimentando a 3 pollos volantones el 9.VII.2005 (I. Pérez/Naumann).

Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdemoro, cultivos de secano, primera observación el 28.III y última el 11.IX (J. Cano).

- San Fernando de Henares, Vega Corpas, 1 ind. el 8.IV (J. A. López Septiem).

- Robledo de Chavela, cercanías del cerro Almojón, 1 ej. el 9.IV (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Bustarviejo, Dehesa Vieja, primera cita del año, 1 ind. el 20.IV (D. Díaz Díaz).

Citas anteriores a 2006

- Manzanares El Real, cercanías del embalse de Santillana, 1 jov. el 20.IX.2002 (C. Sanz y J. Castro).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Chova Piquirroja (*Pyrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

Sin citas de interés.

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Madrid, El Pardo, Mingorrubio, aves con albinismo parcial, 1 ind. con algunas primarias albinas y 1 ej. con plumas albinas en pecho y vientre el 30.IX (F. J. Ortega Pinilla).

- Madrid, cabecera del embalse de El Pardo, 1 ind. parcialmente albino el 7.X (R. Riquelme).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: I.a.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Común (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Sin citas de interés.

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.a.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrion Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: s, lco. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

Sin citas de interés.

Gorrion Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de jov. el 13.V (SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primer jov. capturado el 27.V (SEO-Monticola).

Gorrión Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Soto Pajares, unos 100 ind. el 25.XII (M. Juan/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 77 (VK56).

Gorrión Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Navacerrada, cerro de la Golondrina, grupos numerosos en migración activa el 12.III (F. Roviralta).

- San Fernando de Henares, río Henares, 1 h. con placa incubatriz capturada para anillamiento el 4.VI (J. A. López Septiem). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 64 (VK57).

- Valdemoro, en diferentes hábitat se obtienen las siguientes densidades: 12,2 aves/10 ha en mosaico de olivar-cereal y 22,7 aves/10 ha en bosque de frondosas constituido por *Eleagnus angustifolia* en diciembre (J. Cano).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Aranjuez, ribera del río Tajo junto a las fincas del

Madrileño y Casa de Belmonte, bando de unos 100 ej. alimentándose de las yemas de los chopos el 14.I, y otro ej. en el límite de la provincia con Toledo, cerca de los Arenales, en la misma fecha (B. Molina y E. Escudero/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 112 (VK52).

- Leganés, parque Polvoranca, 13 ej. el 6.III (F. Martín Martín).

- San Fernando de Henares, Vega Corpas, se estiman unos 100 ej. en un bando mixto de pinzones vulgares, jilgueros, pardillos y gorriónes molineros el 7.III, y 1 ind. el 27.III (J. A. López Septiem).

- Cercedilla, puerto de Navacerrada, 3 ind. capturados para anillamiento el 12.III (C. Ponce y otros/SEO-Monticola).

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 m. ad. capturados para anillamiento el 12.III (E. Cercadillo y J. L. Moreno/Troglodytes).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Getafe, primer canto territorial el 13.II (J. Cano).

- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura de 1 jov. el 13.V (SEO-Monticola).

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemoro, primer canto territorial el 15.III (J. Cano).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, lab, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras capturas de 5 jov. el 27.V (SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Estación de Anillamiento de la Presa del Rey, primera captura de 1 jov. el 13.V (SEO-Monticola).

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Moncloa, grupo de unos 30 ind. el 8.IV (J. Sánchez y H. Sánchez).
- Somosierra, casco urbano, 1 m. bebiendo en una fuente el 19.VIII (I. Pérez/Naumann).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, Ico, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas de interés.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, Ciudad Universitaria, 1 h. con 3 volantones el 10.IV (J. Sánchez y H. Sánchez). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 62 (VK37).

Camachuelo Carminoso (*Carpodacus erythrinus*)

Estatus provincial: A extremadamente rara.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: les.

Criterio: todas las citas recibidas.

Citas anteriores a 2006

- Rivas-Vaciamadrid, Casa Eulogio, 1 m. ad. el 22.III.2005 (Ó. Frías/Troglodytes).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, les, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Valdemoro, parque municipal de Bolitas del Airón, últimos ej. como invernante el 22.III y primeros el 9.XII (J. Cano y J. Rosselló).
- Villaviciosa de Odón, parque del Guadarrama, un grupo familiar el 9.VII (J. Sánchez y H. Sánchez). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 74 (VK26).
- Patones de Abajo, soto del río Jarama, primera cita en esta zona visitada desde principios de los años 90, 2 ind. en noviembre (F. Roviralta).

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: les.

Criterio: fechas extremas y observaciones fuera de las cuadrículas de invernada confirmada (Del Moral *et al.* 2002).

- Aranjuez, en el soto del río Tajo, cerca de Casa de Belmonte, 1 ej. el 14.I (B. Molina/SEO-Monticola). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 112 (VK52).
- Alcalá de Henares, páramo de la Casa El Llano, en el P. N. de Los Cerros, al menos 15 ind. en grupos mezclados con escribanos montesinos y trigueros el 26.II (J. Aguilar Bosch y M. López/Alcedo). No estaba citado como invernante en la cuadrícula 54 (VK78).

Citas anteriores a 2006

- Miraflores de la Sierra, zona de pastos junto a un arroyo con bosque de ribera y con restos de paja para el ganado, 3-4 ind. junto a pinzones vulgares y verdecillos el 7.III.2005 (R. Vega).

Escribano Soteño (*Emberiza cirius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.
Sin citas recibidas.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.
Sin citas recibidas.

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: Ico, P. Estival accidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- Chinchón, laguna de San Juan, última captura para anillamiento en invernada o paso prenupcial de 3 h. ad. el 15.III, y primera captura en paso otoñal con 1 h. ad. el 28.X (Ó. Frías, J. Marchamalo, J. Fernández y A. García).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura en invernada o paso prenupcial de 3 ind. el 19.III, primera captura en paso otoñal con 1 ind. el 28.X, pico de capturas con 13 ind. el 10.XI (SEO-Monticola).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Getafe, primer canto territorial el 8.I (J. Cano).

- Prádena del Rincón, se localiza un nido con puesta de 5 huevos el 10.VI (M. Juan/SEO-Monticola). Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 5 (VL54).

- Getafe, base aérea, en los eriales se establece un dormitorio en época estival, observándose durante el crepúsculo la entrada de al menos 75 ej. el 11.VII y de 146 ej. el 10.VIII (J. Cano).

Observaciones de especies exóticas

Cisne Vulgar (*Cygnus olor*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Ánsar Indio (*Anser indicus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, sin citas anteriores a 2006. El área natural de distribución se sitúa en Asia central. Muy frecuente en colecciones y zoológicos, por lo que las observaciones europeas se atribuyen siempre a aves escapadas o asilvestradas (De Juana 2006). Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares El Real, embalse de Santillana, 1 ave junto a 2 tarros canelos el 14.IV (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama). Cita pendiente de ser homologada por el Comité de Rarezas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiaca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña y Países Bajos (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.
Sin citas recibidas.

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapada de cau-

tividad. Las observaciones parecen ser cada vez más frecuentes, aunque en buena parte deben corresponder a escapes o a jóvenes nacidos de parejas reproductoras de colecciones.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, casco urbano: 1 ej. sobrevuela el casco urbano el 27.III (A. Bermejo y J. de la Puente/SEO-Monticola); 2 ej. volando el 28.V (C. Sánchez Delicado, R. Sánchez de la Montaña y J. C. Álvarez Ruiz).

- El Escorial, finca Monesterio, 1 ind. el 2.IV (R. Lacruz/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Manzanares El Real, embalse de Santillana: 1 m. y 1 h. el 14.IV (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 1 m. posado sobre una roca emergida el 1.V (D. González y J. M. Ruiz); desembocadura del arroyo de Chozas, 1 ej. nadando y posado en la orilla el 7.V (R. Riquelme).

- Boadilla del Monte, parque de Montegancedo, 2 ind. en vuelo el 20.IV (I. Yúfera).

- Guadalix de la Sierra, embalse de Pedrezuela: 8 ind. —4 llegan volando desde Guadalix de la Sierra— el 30.VIII, se muestran bastante confiados descansando en las orillas de las colas del lado de la ermita nueva, junto a los pescadores y se ven durante 5 días (J. Aguilar Bosch, C. Martín, C. Castro, G. Merelo y A. H. Ortega Morejón); 1 ave el 2.IX (G. Martín García/SEO-Sierra de Guadarrama); 6 ind. el 5.IX (D. Díaz Díaz); 1 ej. el 8.X (J. Salas); 1 m. el 9.X (F. Martín Martín); 1 ej. el 14.X (C. Martín, G. Merelo y A. H. Ortega Morejón).

- Madrid, embalse de El Pardo: 4 ad. junto a 1 ganso doméstico entre el 13.IX y el 24.IX (F. J. Ortega Pinilla); 3 ind. el 7.X (R. Riquelme); 3 ad. el 5.XI y 9 aves el 16.XII (F. J. Ortega Pinilla).

- El Escorial, Las Radas del Tercio: 2 aves el 29.X y el 8.XII (Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama); 2 ej. el 2.XII (G. Núñez-Lagos y Ó. Llama/SEO-Sierra de Guadarrama).

- Madrid, Moncloa, 2 ind. volando en dirección norte el 26.XII (J. Sánchez Albarrán).

Citas anteriores a 2006

- Valdemorillo, embalse de Valmayor junto a La Pizarrera, 3 ind. el 23.XI.2002 (G. Núñez-Lagos).

Tarro Maorí (*Tadorna variegata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Acollarado (*Callonetta leucophrys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa Bolivia, sur de Brasil al norte de Argentina y Uruguay (Del Hoyo *et al.* 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pato Joyuyo (*Aix sponsa*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayor parte de Norteamérica y parte de Cuba (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada en ocasiones como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Leganés, parque Polvoranca, 1 h. o jov. el 14.VIII (J. J. Gómez Aparicio).

Pato Mandarin (*Aix galericulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Rusia, nor-este de China y Japón. Con poblaciones asilvestradas en Gran Bretaña que parecen ser sedentarias (Del Hoyo *et al.* 1992). Utilizada habitualmente como ave de adorno en parques y jardines.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Galapagar, embalse de Parquelagos, 1 h. el 3.I (C. Sunyer).

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*)

Estatus provincial: A extremadamente rara y posi-

blemente escapada de cautividad, con las poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas. Sin citas recibidas.

Colin de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza. Aparentemente en los últimos años no parecen realizarse sueltas ante la ausencia de observaciones.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s, reproductor aparentemente raro, procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas. Para próximos anuarios no se publicarán aquellas observaciones realizadas en cuadrículas con indicios de reproducción (Díaz *et al.* 1994).

- El Escorial, 1 m. el 26.III (F. Roviralta).

- Fuentidueña de Tajo, al oeste del pueblo, 1 pp. el 22.V (M. Juan/SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 m. ad. el 4.I.2005 (E. Cercadillo y A. Cercadillo).

Pelicano Rosado (*Pelecanus rufescens*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores a 1999.

Criterio: todas las citas recibidas. Las observaciones precisan ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife para poder ser homologadas.

Sin citas recibidas.

Busardo Mixto (*Parabuteo unicinctus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el suroeste de Estados Unidos, Méjico, Centroamérica y gran parte de Sudamérica (Del Hoyo *et al.* 1994).

Utilizada en ocasiones en colecciones de aves y para cetrería.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tortolita Diamante (*Geopelia cuneata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa buena parte de Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Santorcaz, 1 ad. en una zona de huertos, en transición a mosaico de matorral-secano-olivar, volando junto a un bando de gorriónes comunes, se posa en un olmo muerto y luego en unas acacias el 23.VII —en todo momento el ave permanece bastante nerviosa—; su plumaje era impecable, así como su aparente estado de salud (A. Doncel Moratilla).

Cacatúa Galerita (*Cacatua galerita*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Nueva Guinea y Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cacatúa Ninfa (*Nymphicus hollandicus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Su área de distribución natural ocupa la mayoría del interior de Australia (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, Carabanchel, glorieta Los Cármenes, 1 ind. a mediados de julio (J. Sánchez).

Perico Multicolor (*Platycercus eximius*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa parte de Australia, introducida en Nueva Zelanda (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alcorcón, 1 ej. observado por los jardineros en distintos parques del municipio en julio (A. Villares Fernández).

Periquito Común (*Melopsittacus undulatus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución ocupa la mayor parte de Australia, con aves asilvestradas en Florida (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: s en pequeño número, r (con primeros indicios de reproducción en años recientes). Su área de distribución natural ocupa parte de África (Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Camerún, Chad, Costa de Marfil y Nigeria). Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Pozuelo de Alarcón, parque empresarial La Finca, 1 m. y 1 h. volando hacia la Casa de Campo el 13.IX (M. Martín Pajares).

Inseparable de Namibia (*Agapornis roseicollis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Angola, Namibia y Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar de Oreja, urbanización Balcón del Tajo Este, 3 ej. en perfecto estado el 7.X (J. Cano).

Lorito Senegalés (*Poicephalus senegalus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de África y Asia. Con poblaciones asilvestradas en muchas ciudades del mundo (Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo de Cochabamba (*Ara rubrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural es el centro de Bolivia (Del Hoyo *et al.* 1997). Especie en peligro cuyo uso como ave de jaula no está permitido.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Guacamayo Noble (*Diopsittaca nobilis*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Sudamérica (Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia; Del Hoyo *et al.* 1997).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Cabeziazul (*Aratinga acuticaudata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, parque Juan Carlos I, 2 ind., posiblemente los mismos ej. observados a finales de septiembre de 2005, en febrero y septiembre (R. López García).

- Madrid, parque del Capricho, 2 ind. el 2.IV (A. González y E. San Pablo Almazán).

- Madrid, Casa de Campo, 6 ej. en abril (R. López García).

Aratinga Mitrada (*Aratinga mitrata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Perú, Bolivia y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Arganda del Rey, antenas de RTVE junto al desvío de la N-III hacia Morata

de Tajuña, se observa una disputa entre 2 cotorras argentinas que trataban de impedir la entrada a su nido de 1 ind. el 9.IV (J. Seoane, J. A. Calleja y M. Martín/SEO-Monticola).

Aratinga de Guayaquil (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Ecuador y Perú (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aratinga Ñanday (*Nandayus nenday*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina. Presenta poblaciones de aves asilvestradas en Buenos Aires, Canadá y Estados Unidos (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas, excepto las realizadas en cuadrículas con reproducción (Díaz *et al.* 1994; De la Puente *et al.* 1997, 1998; Belinchón *et al.* 1999), a no ser que supongan un cambio en el estatus de reproducción, o la aparición de nuevas colonias no conocidas.

- Velilla de San Antonio, una colonia en un par de nidos de cigüeña blanca el 24.VIII (M. A. Galindo Rodrigo).

- Madrid, parque del Manzanares, una colonia situada dentro de las instalaciones de la E.D.A.R. de La China con al menos 79 ej. el 25.XII (J. Cano).

Citas anteriores a 2006

- Leganés, parque Polvoranca, al atardecer unas 60 aves en varios grupos vuelan en dirección norte el 10.XII.2005 (M. Gómez Gajete).

Amazona Freniázul (*Amazona aestiva*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa parte de Brasil, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997). Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Madrid, Casa de Campo, 1 ej. en abril (R. López García).

Ruiseñor de Japón (*Leiothrix lutea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Utilizada habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea Común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Tejedor de Collar Rojo (*Euplectes ardens*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Carita de Naranja (*Estrilda melpoda*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Estrilda Colinegra (*Estrilda troglodytes*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 4 ind. el 13.IX (J. Marchamalo/SEO-Monticola).

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: citas de reproducción y observaciones fuera de las localidades habituales para la especie (Bermejo *et al.* 2000; Del Moral *et al.* 2002).

- Chinchón, laguna de San Juan, bando de 7 ind. el 26.III, 30 ind. el 15.VI, 1 h. ad. capturada para anillamiento el 1.IX, 2 pp. anilladas el 2.IX, 1 h. ad. anillada el 17.IX, 1 jov. anillado el 29.IX, 3 jov. y 1 m. ad. anillados el 10.X (E. Cercadillo, A. Cercadillo, Ó. Frías, J. L. Moreno, J. Fernández y A. García).

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 8 ind. el 18.XI (J. Marchamalo y M. Juan/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, varios ind. cantando el 6.VIII, la especie ha recolonizado rápidamente el carrizal tras la regeneración del mismo, se capturan 16 aves entre el 26.VIII y el 4.XI, con los primeros jov. el 8.X (SEO-Monticola).

Citas anteriores a 2006

- Chinchón, laguna de San Juan, 2 jov. capturados para anillamiento el 22.I.2005, 1 h. ad. anillada el 15.X.2005 y otra el 9.XI.2005 (E. Cercadillo, J. L. Moreno, A. Cercadillo y Ó. Frías).

Bengalí Cebra (*Amandava subflava*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Diamante Mandarin (*Poephila guttata*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Original de Australia y utilizado habitualmente como ave de jaula.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de Los Albardales, 1 m. capturado para anillamiento el 6.IX (C. Ponce).

Capuchino Damero (*Lonchura punctulata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino de Cabeza Negra (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino de Cabeza Pálida (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gorrion Javanés (*Padda oryzivora*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Viuda Colicinta (*Vidua macroura*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad, de origen africano, sin citas anteriores a 1998.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Canario Común (*Serinus canaria*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Picogordo Enmascarado (*Eophona personata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad. Su área de distribución natural ocupa el sureste de Siberia, norte de China y Japón.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Cardenal Gris (*Paroaria coronata*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.

Zánate (*Quiscalus* sp.)

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.
Sin citas recibidas.



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ AERC TAC 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Versión en Internet: www.aerc.be/aerc_tac.htm.
- ✍ Barrios, F. 2003. Vencejo Cofre *Apus caffer*. En: Martí, R. y Del Moral, J. C. (ed.). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*: 340-341. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ Belinchón, C.; Grande, C.; Guil, N.; Olmedo, S.; Ruiz, M. P. y De Juana, E. 1999. Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1998*: 64-71.
- ✍ Bermejo, A. y De la Puente, J. 2002. Stopover characteristics of Sedge Warbler (*Acrocephalus schoenobaenus*) in central Iberia. *Die Vogelwarte*, 41: 181-189.
- ✍ Bermejo, A.; De la Puente, J. y Pinilla, J. 2002. Fenología, biometría y parámetros demográficos del Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*) en España central. *Ardeola*, 49: 75-86.
- ✍ Bermejo, A.; Moreno-Opo, R. y Molina, B. 2000. Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 48-63.
- ✍ Bernis, F.; De Juana, E.; Del Hoyo, J.; Fernández-Cruz, M.; Ferrer, X.; Sáez-Royuela, R. y Sargatal, J. 1994-2007. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 41(1): 78-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(1): 491-499, 52(2): 289-398, 54(1): 145-153.
- ✍ Clavell, J.; Copete, J. L.; Gutiérrez, R.; De Juana, E. y Lorenzo, J. A. 2005. *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ De Juana, E. 2006. *Aves raras de España. Un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ De Juana, E. y Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología 2006. Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola*, 53: 163-190.
- ✍ De Juana, E.; Del Hoyo, J.; Fernández-Cruz, M.; Ferrer, X.; Sáez-Royuela, R. y Sargatal, J. 2007. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología (Undécima parte: orden Passeriformes, familias Muscicapidae a Sylviidae). *Ardeola* 54(1): 145-153.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1997. *Anuario Ornitológico de Madrid 1996*. SEO-Monticola. Madrid.
- ✍ De la Puente, J.; Bermejo, A. y Seoane, J. (coord.) 1998. *Anuario Ornitológico de Madrid 1997*. SEO-Monticola. Madrid.

- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1992. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Ostrich to Ducks*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1994. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. New World Vultures to Guinea-fowl*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Hoyo, J.; Elliott, A. y Sargatal, J. (ed.) 1997. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos*. Lynx Edicions. Barcelona.
- ✍ Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes de Madrid 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- ✍ Díaz, M.; Martí, R.; Gómez-Manzanaque, Á. y Sánchez, A. 1994. *Atlas de las aves nidificantes en Madrid*. SEO/BirdLife y Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ GAE 2006. *Aves invasoras en España: Lista de especies en las categorías C y E. Versión 2.4*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ García y Gans, F. J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*: 124-125.
- ✍ Juan, M. 2001. El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 2000*: 24-37.
- ✍ Juan, M.; González, D.; Marchamalo, J. y Ruiz, J. M. 2007. Fenología migratoria de la gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) en Madrid (centro de España). *Anuario Ornitológico de Madrid 2006*: 24-39.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Martí, R. y Del Moral, J. C. (Eds.) 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife.
- ✍ Rodríguez, I. 2000. Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid. *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 42-47.
- ✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.



El dormitorio de Lavandera Blanca (*Motacilla alba*) en la Pza. de Conde Casal (Madrid) • Evolución de la invernada de acuáticas en la CAM • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1996-1997 • Observaciones de la Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) en el interior peninsular • La Avutarda (*Otis tarda*) en las áreas cerealistas del Jarama y Henares • Fenología de tres especies de passeriformes palustres en la Estación de Anillamiento de Las Minas (Madrid): el Carricerín Común, el Carricero Común y el Carricero Tordal • El Pechiazul (*Luscinia svecica*) en la Comunidad de Madrid • Los dormitorios invernales de Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes de la Comunidad de Madrid. Enero 1996 • Lista de las aves de Madrid • Lista Sistemática 1996



Presencia durante el otoño de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1991-1997) • Evolución de la población de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1979-1997) • Valoración del estado de conservación de la población de Codorniz (*Coturnix coturnix*) en Madrid • Dinámica estacional del dormitorio de Hirundínidos de la Laguna de San Juan (Chinchón, Madrid): Golondrina Común (*Hirundo rustica*) y Avión Zapador (*Riparia riparia*) • Algunas observaciones sobre la Culebrera Europea (*Circus gallicus*), el Busardo Ratonero (*Buteo buteo*) y el Azor Común (*Accipiter gentilis*) en el suroeste de Madrid • Seguimiento y control de la población de Halcón Común (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. Año 1997 • Censo y seguimiento de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en Madrid. Año 1997 • Primer censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad Autónoma de Madrid (1997) • Censo de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) invernante en la Comunidad Autónoma de Madrid (1998). Algunas notas sobre la evolución, estructura y tamaño de la población • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Enero 1997 • Las aves acuáticas nidificantes en los ríos de la Comunidad de Madrid • Invernada de Láridos en la Comunidad de Madrid: Invernada 1997-1998 • Censo de colonias de Avión Común (*Delichon urbica*) en la ciudad de Madrid • Los marcados especiales de aves: principios básicos, finalidad y su utilización en Madrid • Lista Sistemática 1997



Los Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en las áreas cerealistas del Jarama: resumen de 8 años de estudio • Abundancia en distintos medios y estimación de la población de Tórtola Común (*Streptopelia turtur*) en Madrid • Avifauna de la laguna de Las Esteras: situación actual y problemas de conservación • Censo de avutardas de la Comunidad de Madrid 1998 • Evolución de la población de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid en el periodo 1989-1998 • Situación de la Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid. 1998 • Situación actual del Avión Zapador (*Riparia riparia*) en la Comunidad de Madrid • El Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*) en la Comunidad de Madrid • Anillamiento en Madrid. I. Passeriformes • Situación del Águila Imperial (*Aquila adalberti*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de la población reproductora de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de las poblaciones reproductoras de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en dos ZEPAs de la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo de ardeidas coloniales en la Comunidad de Madrid. 1998 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo de acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1997-1998 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • El Pico Menor (*Dendrocyops minor*) en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 1998

Situación de la población reproductora de Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*) en la Comunidad de Madrid • El Gorrión Moruno (*Passer hispaniolensis*) en la Comunidad de Madrid • Evolución de la población de Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y distribución actual del Bengalí Rojo (*Amandava amandava*) en la Comunidad de Madrid • La Comunidad de aves acuáticas en la laguna artificial “Soto Mozanaque” (Algete) • Mortalidad de rapaces nocturnas en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a partir de los ingresos en un centro de recuperación • Primeros datos sobre la mortalidad de aves por impacto con aviones en la Base Aérea de Getafe (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Agateador Común (*Certhia brachydactyla*) en la Sierra de Ayllón (Sistema Central) • Fenología del paso de otoño del Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*) en una localidad de la Comunidad de Madrid en 1999 • Notas de campo sobre la Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*) en el Monte de El Pardo • Campañas de anillamiento en Madrid en 1999 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1998-1999 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Lista Sistemática 1999



Distribución espacio-temporal del Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Comunidad de Madrid • El Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la Comunidad de Madrid • Distribución y densidad de machos reproductores de Sisón Común (*Tetrax tetrax*) en la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” durante la primavera de 2000 • Datos sobre la situación del Torcecuello (*Jynx torquilla*) durante la época de cría en los valles del Lozoya y Jarama • Avifauna nidificante en los sotos fluviales de la Comunidad de Madrid • Avifauna estival en una campiña de la sierra de Guadarrama en Madrid • Evolución poblacional y nidotópica de tres buitreras en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) • Datos sobre la reproducción del Mirlo Común (*Turdus merula*) en dos áreas urbanas de Madrid • Acerca del primer canto territorial en cinco especies de aves • Migración e invernada del Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*) en el sur de Madrid durante el 2000 • La gestión de los residuos sólidos urbanos y las especies generalistas. Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de la población de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. 2000 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 1999-2000 • Censo invernal de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Censo invernal de Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Lista Sistemática 2000





Anuarios ornitológicos y ornitología en España • El Porrón Pardo (*Aythya nyroca*) en la Comunidad de Madrid • Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. I. Géneros *Recurvirostra*, *Charadrius*, *Calidris*, y limícolas accidentales • La comunidad de aves del monte de Valdelatas (Madrid): un estudio basado en el anillamiento • Migración del Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) en el tramo bajo del río Jarama en 2001 • Datos sobre la Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*) y el Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en el valle del Lozoya y Somosierra • Topónimos y características de los humedales con interés ornitológico del Parque Regional del Sureste de Madrid • Campaña de anillamiento en el paso otoñal del año 2001 en la Estación de Anillamiento de Las Minas (San Martín de la Vega, Madrid) • Población reproductora, estado y propuestas de conservación del Cernícalo Primilla (*Falco naumanni*) en la Comunidad de Madrid • Censos invernales de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. Años 2000 y 2001 • Censo de la población reproductora de Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y seguimiento de la población de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo y salvamento de nidos de las poblaciones nidificantes de Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*) y Pálido (*C. cyaneus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2001 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2001 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2000-2001 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Lista Sistemática 2001



Estatus regional y preferencias ambientales de la avifauna madrileña durante el invierno • Aporte de presas en nidos de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en el centro de España • Tamaño de la población reproductora y ubicación de nidos de Paloma Torcaz (*Columba palumbus*) en los jardines y sotos de Aranjuez • La población de Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*) del monte de Valdelatas (Madrid): variaciones estacionales y preferencias de hábitat • Fenología y selección de hábitat de dos especies de mosquiteros (*Phylloscopus trochilus* y *Phylloscopus collybita*) en un parque periurbano de Madrid (monte de Valdelatas) • Fenología del Petirrojo (*Eritacus rubecula*) en el tramo bajo del río Jarama • Censo de la población reproductora y caracterización del hábitat del Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Población reproductora e invernante de Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*) en Madrid. Año 2002 • Seguimiento de la población reproductora de Águila Real (*Aquila chrysaetos*) en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Censo de la población reproductora de Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en la ZEPA "Alto Lozoya". Año 2002 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2001-2002 • Censos invernales de Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*) en la Comunidad de Madrid. Invernadas 2001-2002 y 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Lista Sistemática 2002




Distribución temporal y preferencia de hábitat de los limícolas escasos en la Comunidad de Madrid. II. Géneros *Phlimonachus*, *Limosa*, *Numenius* y *Tringa* • Migración e invernada del Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*) en la Comunidad de Madrid • Expansión y situación actual del Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*) en la Comunidad de Madrid • Descripción y cuantificación de la comunidad de aves reproductora en los espacios gestionados por Patrimonio Nacional en el centro de España • Fidelidad a los sitios y fenología en la invernada de la Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*) en la Comunidad de Madrid (1998-2002) • Censo de Abejero Europeo (*Pernis apivorus*) en la Comunidad de Madrid. Año 2003 • Censo de ardeidas coloniales arborícolas en la Comunidad de Madrid. Año 2002 • Evolución de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la sierra de la Cabrera de Madrid (1994-2004) • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2002-2003 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004 • Caracteres climáticos del año 2003 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2003

Muda y reproducción del Pato Colorado (*Netta rufina*) en la Comunidad de Madrid • Estatus y distribución del Búho Campestre (*Asio flammeus*) en la Comunidad de Madrid • Revisión histórica y análisis de las observaciones de Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en el centro de España • La comunidad de aves del monte de Valdelatas durante el paso migratorio postnupcial (2003-2004) • Densidades de algunas especies de aves comunes en un tramo del río Manzanares • Tasas de ocupación de cajas nido para paseriformes en pinares y robledales de la sierra de Guadarrama • Paso migratorio postnupcial de curruacas (género *Sylvia*) en el curso medio del río Guadarrama (Madrid) • Paso postnupcial de la Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*) y el Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) en el monte de Valdelatas (2003-2004): fenología y selección de hábitat • Censo y seguimiento de la población reproductora de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid. Año 2004 • Censo de la población nidificante (año 2004) e invernante (años 2002 y 2004) del Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2003-2004 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005 • Caracteres climáticos del año 2004 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2004



Tendencias poblacionales de la avifauna madrileña: diez años de programa SACRE • El Alimoche Común (*Neophron percnopterus*) en la Comunidad de Madrid: distribución histórica, estatus y fenología • Abundancia y distribución invernal de la Ganga Ortega (*Pterocles orientalis*) y la Ganga Ibérica (*Pterocles albata*) en la Comunidad de Madrid • La Cotorra Argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid: expansión y hábitos de nidificación • Razón de sexos, fenología reproductiva, productividad y periodo de muda en una población de Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*) en el sur de la ciudad de Madrid • Censo y seguimiento de la población reproductora de Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*) en la Comunidad de Madrid. Año 2005 • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2004-2005 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2005-2006 • Caracteres climáticos del año 2005 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2005



Fenología migratoria de la gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus*) en Madrid (centro de España) • Tendencia reciente y viabilidad futura de las poblaciones de sisón común (*Tetrax tetrax*) en la Comunidad de Madrid • Población reproductora de rapaces diurnas en una zona de media montaña de la sierra de Guadarrama (Madrid) • Nuevos datos históricos de quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) en Madrid y Sistema Central • Dormideros invernales de buitre leonado (*Gyps fulvus*) en La Pedriza del Manzanares (Madrid) • Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Invernada 2005-2006 • Invernada de láridos en la Comunidad de Madrid. Invernada 2006-2007 • Caracteres climáticos del año 2006 en la Comunidad de Madrid • Lista Sistemática 2006

